

43.

43

635
Cat
Oee

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

AUG.^{re} VAN GEERT,

HORTICULTEUR,

Rue de Belgrade, près la Station du Chemin de Fer,

GAND,

Membre des principales Sociétés d'Horticulture de la Belgique et de l'Étranger.

❧ PRIX-COURANT POUR 1849. ❧

GAND.

IMPRIMERIE DE D. VERHULST, PETITE RUE DE LA STATION, 3.

BIBLIOTHÈQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

AVIS.

Messieurs les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés de vouloir indiquer exactement leur adresse et par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse; à moins d'ordre contraire je me sers ordinairement des Chemins de Fer, Bateaux-à-vapeur et Diligences; les frais d'emballage et d'expédition, ainsi que les risques et périls sont pour le compte de l'acheteur; de mon côté je n'épargne aucun soin pour que les plantes arrivent en bon état.

Les prix sont cotés en argent Belge ou de France. Je dispose ordinairement à six mois. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, sont priées d'accompagner leurs commandes d'une traite de commerce sur l'un des principaux banquiers de Paris, Bruxelles, Gand ou Anvers.

(On est prié d'affranchir.)

Prices in franks and centimes.

One hundred centimes to à frank; and 25 franks 25 centimes to a pound sterling.

NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgaertner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind höflichst ersucht, Ihre Adresse genau aufzugeben, und zu bemerken, auf welchem Wege die Versendung Statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich p^r Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr des Empfangers, ebenso sind auch die Verpackungs und Versendungskosten für dessen Rechnung. Meinerseits biete ich indessen Alles auf, dass die Pflanzen im guten Zustande ankommen. Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt und trassire ich gewöhnlich 6 Monate nach dato meiner factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftsverbindung stehe, sind gebeten, Ihren Aufträgen mit einer Anweisung auf einem der ersten Banquier's von Paris, Brussel, Gent oder Antwerpen beizufügen.

(Man ist gebeten, die Briefe zu frankiren.)

CATALOGUE DE PLANTES

CULTIVÉES CHEZ

AUG.^{TE} VAN GEERT,

HORTICULTEUR,

PRÈS LA STATION DU CHEMIN DE FER,

GAND.

Prix-Courant pour 1849.

N. B. Les Plantes marquées d'un *b.* sont bulbeuses. — Celles marquées d'un *g.* sont grimpantes, et j'ai désigné par les lettres *p. f.* celles qui, plantées en pleine terre au printemps, y acquièrent pendant l'été de grandes dimensions et contribuent puissamment ainsi à l'ornement des jardins. — Celles marquées d'un *o.* peuvent passer l'hiver en Orangerie. — Celles désignées par un *e.* doivent passer l'été dehors, en pots; et celles précédées d'un *eo.* doivent séjourner pendant l'été dans l'Orangerie, pour mieux fleurir dans la Serre Chaude pendant l'hiver ou au printemps. — Celles marquées des lettres *or.* se plaisent dans la Serre à Orchidées ou à Palmiers, c'est-à-dire chaudes et humides.

SERRE CHAUDE.

| | F. C. | | F. C. | | Fr. C. |
|---|-------|---|-------|---|--------|
| <i>e</i> Abutilon (<i>v. serre fr.</i>) | | <i>or</i> Æschyn. Boschianus. | » 50 | — pulchra | 2 » |
| Acceratium Ganitri . . . | 2 » | » — grandiflorus . . . | » 50 | <i>or</i> Ardisia crenulata . . . | » 50 |
| Àchimenes alba (<i>Niphæa</i>) . . . | » 50 | » — Horsfieldii . . . | » 50 | » — humilis | 3 » |
| » — albo lineata | 6 » | » — Lobbianus | 1-50 | » — hymenandra | 5 » |
| » — Arenberghii | 1 » | » — longiflorus | 5 » | » — madagascariensis . . . | 2 » |
| » — astrosanguinea | » 50 | » — miniatus | 5 » | » — mexicana | 5 » |
| » — argyrostigma | » 50 | » — Paxtonii | 1-50 | » — pyramidalis | 5 » |
| » — coccinea | » 50 | » — pulcher | 1-50 | » — solonacea | 2 » |
| » — — formosa | 1 » | » — purpurascens | 1 » | <i>g</i> Aristolochia brasiliensis . . | 1 » |
| » — — grandiflora | 2 » | » — radicans | 1-50 | » — gigas | 1-50 |
| » — — lilacina | 2 » | » — ramosissimus | » 50 | » — grandiflora | 2 » |
| » — — splendens | » 50 | » — Roxburghii verus . . . | 2 » | » — Kämpferi | 1 » |
| » — cupreata | 1 » | » — speciosus | 5 » | » — ornitocephala | 2 » |
| » — Gheisbreghtii vera . . . | 2 » | » — zebrianus | 1 » | Artocarpus integrifolia . . . | 5 » |
| » — Ingramii | 2 » | <i>g</i> Allamanda cathartica . . . | 2 » | <i>b</i> Arum campanulatum | 8 » |
| » — gloxinæ flora | 10 » | » — Schottii | 15 » | » — odorum | 5 » |
| » — grandiflora | » 50 | » — verticillata | 5 » | » — trilobatum | » 50 |
| » — hirsuta | » 50 | Alpinia nutans | 2 » | Asclepias gigantea (calotropis) | 3 » |
| » — Liebmannii | » 50 | Alloplectus dichrous . . . | 75 | Aspidistra elatior fol. striatis | 1-50 |
| » — longiflora | » 50 | » — Pinelianus | 75 | Astrapea mollis | 1 » |
| » — multiflora | 2 » | <i>b</i> Amaryllis fl. pleno | 20 » | » — Ameliae | 2 » |
| » — patens | » 50 | » — de semis, force à fleurir, les 12 | 25 » | » — Wallichii | 1-50 |
| » — major | 1-50 | » — 15 belles variétés, avec noms, de 2 à 8 » | | Balsamina platypetala . . . | 1 » |
| » — pedunculata | » 50 | <i>p t</i> Angelonia gardneri . . . | 1 » | <i>g</i> Banisteria argyroph. | 2 » |
| » — picta | » 50 | » — pubescens | 1 » | » — tenuis | 1 » |
| » — rosea | » 50 | Anona fruticosa | 2 » | Barnadesia rosea | 1 » |
| » — Guntherii | 2 » | Aphelandra aurantiaca . . . | 5 » | » — grandifolia | 4 » |
| » — rubida (<i>Niphæa</i>) . . . | 1 » | » — cristata | 1-50 | <i>or e</i> Barbaccenia purpurea | 2 » |
| <i>or</i> Æchmea discolor | 6 » | » — elegans | 2 » | » — sanguinea | 2 » |
| » — fulgens | 5 » | » — longipes | 1 » | » — squamata | 4 » |
| <i>e</i> Æschynanthus atrosanguineus | 1 » | Aralia guatemalensis . . . | 25 » | | |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|
| <i>g Beaumontia grandifl.</i> | 1 » | <i>Catesbæa Lindeniana</i> | 5 » | <i>Crinum virgineum</i> | 2 » |
| <i>eo Begonia albo coccin.</i> | 4 » | <i>Camellia axillaris</i> | 2 » | <i>Croton angustif. fol. pict.</i> | 4 » |
| » — <i>caulostylis (argyrocelis.)</i> | 3 » | <i>Cecropia palmata</i> | 5 » | » — <i>pictum</i> | 2 » |
| » — <i>carolinæfolia</i> | 4 » | <i>eo Centradenia rosea</i> | 50 » | » — <i>variegatum</i> | 2 » |
| » — <i>coccinea</i> | 1 » | » <i>Centropogon fastuos.</i> | 1 » | <i>Curema rubricaulis</i> | 3 » |
| » — <i>calcophylla</i> | 1 » | <i>or Cephalotus follicul.</i> | 75 » | <i>Cycadées (v. aux spécialités.)</i> | |
| » — <i>dipetata</i> | 2 » | <i>Cerbera fruticosa</i> | 5 » | <i>Cyrtanthus obliquus fort</i> | 5 » |
| » — <i>fagifolia</i> | 2 » | » — <i>manghas</i> | 2 » | <i>Cyrtoceras reflexum</i> | 3 » |
| » — <i>fuchrioides</i> | 2 » | » — <i>tanghin</i> | 2 » | <i>Cyperus papyrus</i> | 5 » |
| » — <i>hydrocotilefolia</i> | 50 » | <i>Cereus (v. aux Cactées).</i> | | <i>Dasyllirion serratifolia</i> | 5 » |
| » — <i>insignis</i> | 1 » | <i>g Ceropegia africana</i> | 1 » | <i>Dichorisandra foliis</i> | |
| » — <i>manicata</i> | 1 » | » — <i>elegans</i> | 1 » | » — <i>purpureis</i> | 10 » |
| » — <i>palmata</i> | 2 » | » — <i>stapeliformis</i> | 1 » | » — <i>ovata</i> | 2 » |
| » — <i>ramentacea</i> | 2 » | <i>pt Cestrum aurantiacum</i> | 1 » | » — <i>thyrsiflora</i> | 1 » |
| » — <i>rupestris</i> | 2 » | » — <i>candidum</i> | 5 » | <i>Bidymocarpus Rhxi.</i> | 50 » |
| » — <i>sanguinea</i> | 1 » | » — <i>roseum</i> | 50 » | <i>Dillenia speciosa</i> | 15 » |
| » — <i>stigmoma</i> | 2 » | <i>Chamberlaynia congesta</i> | 5 » | <i>eo Dionæa muscipula</i> | 3 » |
| » — <i>zebrina</i> | 1 » | <i>Chirita sinensis</i> | 1 » | <i>g Dioscorea variegata</i> | 3 » |
| <i>Belangeria speciosa</i> | 15 » | » — <i>Moonii</i> | 3 » | » — <i>Dipladenia atropurp.</i> | 3 » |
| <i>Beloperone oblongata</i> | 50 » | » — <i>Walkerii</i> | 4 » | » — <i>crassinoda</i> | 5 » |
| <i>Biophitum sensitivum</i> | 2 » | » — <i>zeylanica</i> | 1 » | » — <i>splendens</i> | 5 » |
| <i>Bignonia alba</i> | 3 » | <i>Cinnamomum albisfor.</i> | 2 » | <i>Dillaria ilicifolia</i> | 1 » |
| <i>g — Chamberlaynii</i> | 2 » | » — <i>aromaticum</i> | 5 » | <i>g Distemma aurantiac.</i> | 1 » |
| » — <i>grandifolia</i> | 2 » | <i>pt Cleome purpurea</i> | 1 » | <i>Bombaya Ameliæ</i> | 2 à 6 » |
| » — <i>Pareira</i> | 5 » | <i>Clerodendr. Devoniana</i> | 3 » | <i>or Dorstenia ceratosan-</i> | |
| » — <i>pentaphylla</i> | 1 » | » — <i>fallax</i> | 3 » | » — <i>thes</i> | 2 » |
| » — <i>picta</i> | 1 » | » — <i>fragrans fl. rub.</i> | | <i>Doryanthus excelsa</i> | 12 à 20 » |
| » — <i>schinifolia</i> | 1 » | » — <i>simple</i> | 1 » | <i>Dracæna ensifolia</i> | 10 » |
| » — <i>venusta</i> | 1 » | » — <i>Hugelii</i> | 1 » | » — <i>Brasiliensis</i> | 2 » |
| » — <i>Tweediana</i> | 1 » | » — <i>glaucum</i> | 2 » | » — <i>draco</i> | 2 » |
| <i>Bilbergia amœna</i> | 1 » | » — <i>hastatum</i> | 1-50 » | » — <i>elliptica</i> | 5 » |
| » — <i>discolor</i> | 1 » | » — <i>infortunatum</i> | 4 » | » — <i>ferrea</i> | 2 » |
| » — <i>purpurea rosea</i> | 8 » | » — <i>Kæmpferi</i> | 8 » | » — <i>versicolor</i> | 2 à 6 » |
| » — <i>sps. nova</i> | 5 » | » — <i>lævifolium</i> | 1 » | » — <i>fragrans</i> | 4 » |
| <i>Bixa orellana</i> | 1 » | » — <i>paniculatum</i> | 5 » | » — <i>nova sps.</i> | 4 » |
| <i>Bishoffea javanica</i> | 5 » | » — <i>siphonanthus</i> | 2 » | » — <i>umbraculifera</i> | 10 à 40 » |
| <i>Bombax insign.</i> | 10 à 40 » | » — <i>speciosum</i> | 2 » | <i>Drymonia punctata</i> | 1 » |
| » — <i>microphyllum</i> | 2 » | <i>g — splendens</i> | 2 » | » — <i>suberecta</i> | 3 » |
| <i>Bonapartia (v. serre fr.)</i> | | » — <i>varietas</i> | 3 » | <i>Duchartrea erecta</i> | 1 » |
| <i>Bougainvillea splend.</i> | 2 » | <i>Clethra macrophylla</i> | 4 » | <i>eo Dyckia remotiflora</i> | 1 » |
| <i>Bromelia caratas</i> | 15 » | <i>g Clitoria fulgens</i> | 5 » | » — <i>Echeveria gibbiflora</i> | 2 » |
| <i>Brownea erecta</i> | 50 à 150 » | <i>o Clivia nobilis</i> | 2 à 8 » | » — <i>fulgens</i> | 1 » |
| » — <i>grandiceps</i> | 8 » | <i>Coccoloba pubescens</i> | 50 » | » — <i>pumila</i> | 30 » |
| <i>Brugmansia floribunda</i> | 2 » | <i>Coccocypselum discolor</i> | 50 » | » — <i>secunda</i> | 75 » |
| <i>Brunsfelsia Lockartii</i> | 3 » | <i>e Coffea arabica</i> | 1 » | <i>g Echites atropurpurea</i> | 3 » |
| » — <i>floribunda</i> | 2 » | » — <i>mauritiana</i> | 5 » | » — <i>carassa</i> | 5 » |
| » — <i>latifolia</i> | 1 » | <i>Columnnea crassifolia</i> | 1 » | » — <i>hirsuta</i> | 5 » |
| » — <i>undullata</i> | 1 » | » — <i>Lindeniana</i> | 30 » | » — <i>nobilis</i> | 20 » |
| » — <i>violacea</i> | 1 » | » — <i>pillosa</i> | 6 » | » — <i>melaleuca</i> | 2 » |
| » — <i>Siebertii</i> | 2 » | » — <i>splendens</i> | 1 » | » — <i>nutans</i> | 1 » |
| <i>Cesalpinia oboordata</i> | 3 » | » — <i>zebrina</i> | 75 » | » — <i>odoratissima</i> | 5 » |
| <i>b Caladium bicolor</i> | 5 » | <i>g Combretum Afzeli</i> | 4 » | » — <i>paniculata</i> | 5 » |
| » — <i>violaceum</i> | 3 » | » — <i>comosum (Poirrea)</i> | 5 » | » — <i>rosa campestris</i> | 50 » |
| <i>Calotropis gigantea</i> | 5 » | » — <i>grandiflorum</i> | 3 » | » — <i>suberecta</i> | 2 » |
| <i>Campylobotris discolor</i> | 15 » | » — <i>macrophyllum</i> | 8 » | » — <i>splendens</i> | 5 » |
| <i>b Canna (v. serre fr.)</i> | | » — <i>purpureum</i> | 5 » | » — <i>spicata</i> | 10 » |
| <i>Capserarium salicifol.</i> | 1 » | <i>b Costus guyanensis</i> | 2 » | <i>eo Epiphyllum Russell.</i> | 1 » |
| <i>Carica papaya</i> | 1 » | » — <i>Crinum amabile, fort</i> | 12 » | » — <i>trunc. violaceum</i> | 1 » |
| <i>Carolinea alba</i> | 5 » | » — <i>augustum, fort</i> | 15 » | <i>Eranthemum semper-</i> | |
| » — <i>fastuosa</i> | 8 » | » — <i>belle variété de Ste</i> | | » — <i>florens</i> | 2 » |
| <i>Caryophyllus aromat.</i> | 20 » | » — <i>Cathérine</i> | 15 » | » — <i>montanum</i> | 1 » |
| <i>Cassia brasiliiana</i> | 1 » | » — <i>à odeur de vanille</i> | 10 » | » — <i>variable</i> | 1 » |
| <i>Carraginata lingulata</i> | 25 » | » — <i>scabrum, fort</i> | 5 » | <i>pt Erythrina Humei</i> | 3 » |
| | | | | » — <i>speciosa</i> | 2 » |



| | Fr. C. |
|--|---------|
| <i>pt Erythrina versicolor</i> | 1 " |
| Erythrochiton Brasi- | |
| <i>liensis</i> | 10 " |
| e Eugenia Brasiliensis. | 5 " |
| " — <i>elegans</i> | 2 " |
| " — <i>jambos</i> | 1 " |
| or — <i>ternatifolia</i> | 5 " |
| Euosma <i>radicans</i> | 1 " |
| Elaeocarpus <i>lanceolatus</i> | 5 " |
| eo Euphorbia Breonii . . | 1 " |
| " — <i>jacquiniflora</i> | 1 " |
| " — <i>meloformis</i> | 2 " |
| " — <i>pulcherrima</i> | 75 " |
| " — <i>lutescens</i> | 5 " |
| " — <i>punicea</i> | 5 " |
| " — <i>splendens</i> | 1 " |
| Euphorbia <i>longana</i> . . . | 5 " |
| Evolvulus <i>purpureo cœ-</i> | |
| <i>rulens</i> | 2 " |
| Ficus <i>elastica</i> | 2 " |
| — <i>diversifolia</i> | 2 " |
| — <i>Murrayana</i> | 4 " |
| — <i>Neumanniana</i> | 2 " |
| eo Fimbraria <i>muricata</i> . . | 2 " |
| Fourcroya <i>longavæfort</i> | 75 " |
| Francisca <i>Augusta</i> . . . | 5 " |
| — <i>hydrangæf. (vera)</i> . . | 40 " |
| — <i>Hopeana</i> | 1 " |
| — <i>latifolia</i> | 1 " |
| — <i>macrophylla</i> . . 2 à 5 | " |
| — <i>Pohleana</i> | 2 " |
| Garcinia <i>nova</i> sps. | 20 " |
| — <i>mangostana</i> | 50 " |
| — <i>australis</i> | 10 " |
| Gardenia <i>florida</i> | 1 " |
| — <i>Devoniana</i> | 50 " |
| — <i>Fortuni</i> | 10 " |
| — <i>Gardneriana</i> | 5 " |
| — <i>longiflora</i> | 5 " |
| — <i>radicans</i> | 50 " |
| — <i>Stanleyana</i> | 6 " |
| — <i>Sherbourniæ</i> | 5 " |
| — <i>tetrasperma</i> | 1 " |
| — <i>Whitfieldii</i> | 10 " |
| Gastonia <i>dentata</i> | 15 " |
| — <i>palmata</i> | 10 " |
| Gauy-Lussachia <i>pseudo-</i> | |
| <i>vaccinium</i> | 10 " |
| — <i>pulcherrima</i> | 10 " |
| Geissomeria <i>longiflora</i> | 1 " |
| Gesneria <i>arborea</i> | 1 " |
| b — <i>barbata</i> | 1 " |
| — <i>Douglasii fort</i> | 2 " |
| — <i>verticillata fort</i> . . . | 2 " |
| — <i>discolor</i> | 5 à 5 " |
| — <i>elliptica</i> var. <i>lutea</i> . | 5 " |
| — <i>Geroltiana</i> | 1 " |
| — <i>Gardneriana</i> | 1 " |
| — <i>hondensis</i> | 1 " |
| — <i>libanensis</i> | 2 " |
| — <i>laterata</i> | 1 " |
| — <i>latifolia</i> | 1 " |
| — <i>longifolia</i> | 1 " |
| — <i>mollis</i> | 1 " |

| | Fr. C. |
|---|--------|
| Gesneria <i>oblongata</i> . . . | 1 " |
| — <i>polyantha</i> | 5 " |
| — <i>pulcherrima</i> | 5 " |
| — <i>reflexa</i> | 1 " |
| — <i>rupestris</i> | 4 " |
| — <i>rutilans</i> | 1 " |
| — <i>Sultoni alba</i> | 2 " |
| — <i>splendens</i> | 1 " |
| — <i>tubiflora</i> | 1 " |
| — <i>rosea</i> | 1 " |
| — <i>zebrina</i> | 1 " |
| Gillibertia <i>palmata</i> . . | 10 " |
| — <i>dentata</i> | 15 " |
| eo Globba <i>nutans</i> | 2 " |
| Gloriosa <i>superba</i> | 1 " |
| Gloxinia <i>caulescens</i> . . . | 50 " |
| — <i>cerina</i> | 50 " |
| — <i>digitaliflora</i> | 1 " |
| — <i>discolor</i> | 1 " |
| — <i>Gesnerioides</i> | 50 " |
| — <i>Goodii</i> | 75 " |
| — <i>grandiflora</i> | 50 " |
| — <i>hybrida</i> | 50 " |
| — <i>macrophylla</i> fol. var. . | 50 " |
| — <i>B.^{on} de Pronay</i> | 5 " |
| — <i>Boëldieu</i> | 5 " |
| — <i>comte Bathyani</i> | 6 " |
| — <i>David</i> | 4 " |
| — <i>D.^r Lindley</i> | 10 " |
| — <i>duch. de Croy</i> | 10 " |
| — <i>rubra</i> | 5 " |
| — <i>maxima</i> | 50 " |
| — <i>alba</i> | 1 " |
| — <i>com^{te} Suza Thun</i> . . . | 5 " |
| — <i>com^{te} Léopoldine</i> | |
| <i>Thun</i> | 5 " |
| — <i>Fyflana</i> | 2 " |
| — <i>gigantea superba</i> . . . | 1 " |
| — <i>Menziesii</i> | 50 " |
| — <i>Major Esperen</i> | 5 " |
| — <i>Meyerbeer</i> | 5 " |
| — <i>Worthleyana</i> | 5 " |
| — <i>magnifica</i> | 50 " |
| — <i>Pressi</i> | 50 " |
| — <i>Frédéric Lennis</i> . . . | 8 " |
| — <i>Godefroid de</i> | |
| <i>Bouillon</i> | 6 " |
| — <i>Priestleyana</i> | 50 " |
| — <i>Passinghamii</i> | 1 " |
| — <i>rubra</i> | 50 " |
| — <i>albo sanguinea</i> | 2 " |
| — <i>c.^{te} de Flandre</i> | 10 " |
| — <i>comtesse Thérèse</i> | |
| <i>Thun</i> | 3 " |
| — <i>delicatissima</i> | 1 " |
| — <i>Handleyana</i> | 1 " |
| — <i>Jochtii</i> | 5 " |
| — <i>M.^{me} Bravy</i> | 7 " |
| — <i>rosea alba</i> | 1 " |
| — <i>maxima</i> | 1 " |
| — <i>rosea</i> | 75 " |
| — <i>Rollissonii</i> | 1 " |
| — <i>retine des Pays-</i> | |
| <i>Bas</i> | 1 " |

| | Fr. C. |
|---|--------|
| Gloxinia <i>Schottii</i> | 75 " |
| — <i>Snowiana</i> | 1-50 " |
| — <i>Stanleyana</i> | 1-50 " |
| — <i>speciosa</i> | 50 " |
| — <i>alba</i> | 50 " |
| — <i>candida</i> | 50 " |
| — <i>Cartonii</i> | 1 " |
| — <i>comtesse Anna</i> | |
| <i>Thun</i> | 5 " |
| — <i>insignis</i> | 1 " |
| — <i>Teuchlerii</i> | 4 " |
| Gonolobus <i>hispidus</i> . . . | 2 " |
| b Griffinia <i>intermedia</i> . . | 4 " |
| " — <i>hyacinthina</i> | 5 " |
| " — <i>Liboniensis</i> | 10 " |
| Gustavia <i>Augusta</i> | 5 " |
| or Guzmanina <i>tricolor</i> . . | 4 " |
| b Hæmanthus <i>albiflor.</i> . . | 2 " |
| " — <i>coccineus</i> | 5 " |
| " — <i>puniceus</i> | 4 " |
| " — <i>tigrinus</i> | 4 " |
| Hamiltonia <i>suaveolens</i> . . | 2 " |
| Hedychium <i>coronarum</i> . . | 2 " |
| b. eo — <i>Gardneriana</i> | 2 " |
| Heliconia <i>farinosa</i> | 2 " |
| " — <i>speciosa</i> | 5 " |
| g Heteropteris <i>chrysop.</i> | 2 " |
| " — <i>tenuis</i> | 1 " |
| Hexacentris <i>coccinea</i> . . | 1 " |
| pt Hibiscus <i>cameronis</i> | |
| <i>fulgens</i> | 2 " |
| " — <i>regius</i> | 2 " |
| " — <i>splendens</i> | 1 " |
| " — <i>tulpiiflorus</i> | 4 " |
| Hillia <i>longiflora</i> | 5 " |
| Hindsia <i>longiflora</i> | 2 " |
| — <i>alba odorata</i> | 5 " |
| — <i>violacea</i> | 5 " |
| Hirrea <i>Houllettiana</i> . . . | 4 " |
| Hidromestus <i>maculatus</i> . . | 2 " |
| Hohenbergia <i>strobi-</i> | |
| <i>lanthes</i> | 1 " |
| Homalanthus <i>lesche-</i> | |
| <i>naultianus</i> | 6 " |
| Holmskioldia <i>sanguinea</i> . | 1 " |
| Hoya <i>carnosa</i> | 50 " |
| — <i>foliis argenteus</i> | 25 " |
| — <i>pictus</i> | 25 " |
| — <i>Cunninghamii</i> | 5 " |
| — <i>imperialis</i> | 20 " |
| — <i>trinervia</i> | 10 " |
| Hypocyrtia <i>glabra</i> | 2 " |
| — <i>cilliosa</i> | 2 " |
| eo Inga <i>fulgens</i> | 2 " |
| " — <i>Houstoni</i> | 2 " |
| " — <i>pulcherrima</i> | 2 " |
| " — <i>Harrissii</i> | 1 " |
| g Ipomea <i>fiscifolia</i> | 1 " |
| — <i>Horsfalliæ</i> | 2 " |
| — <i>Rollissonii</i> | 1 " |
| — <i>grandiflora</i> | 1 " |
| — <i>macrantha</i> | 8 " |
| — <i>mutabilis</i> | 2 " |
| — <i>tyrianthina</i> | 2 " |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---------------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------------|---------|
| <i>h Ismene calathinum</i> . . . | 1 | <i>Melastoma Lindeniana</i> | | <i>e Pinceneetitia lon-</i> | |
| <i>or Ixora alba</i> . . . | 2 à 4 | intermedia . . . | 3 | gifolia . . . | 5 à 50 |
| <i>or — arborescens</i> . . . | 2 à 5 | — stellata . . . | 1 | <i>Piper nigrum</i> . . . | 5 |
| » — bandhuca . . . | 2 | <i>Mikania fragrans</i> . . . | 1 | <i>or Pitcairnia iridifolia</i> . . . | 1 |
| » — coccinea . . . | 2 à 5 | <i>Millingtonia simplicif.</i> | 10 | » — aurantiaca . . . | 5 |
| » — cuneifolia . . . | 2 | <i>Mimosa sensitiva</i> . . . | 1 | » — punicea . . . | 1 |
| » — crocata . . . | 2 | <i>Musa Cavendishii fort</i> | 4 à 10 | » — undulata . . . | 5 |
| » — grandiflora . . . | 2 | — coccinea . . . | 5 | <i>Pleroma Benthamiana</i> . . . | 2 |
| » — hydrangæformis . . . | 20 | — discolor . . . | 6 | <i>Plumbago Larpentæ</i> . . . | 4 |
| » — salicifolia . . . | 15 | — rosacea . . . | 5 | <i>Poinciana regia</i> . . . | 5 |
| » — odorata . . . | 10 | — sps. Guatemala . . . | 10 | <i>Poinsettia pulcherrima</i> . . . | 75 |
| <i>eo Jacaranda clausse-</i> | | — zebrina . . . | 75 | » — lutescens . . . | 5 |
| niana . . . | 25 | <i>Mussenda faondosa</i> . . . | 2 | <i>Porphyrocoma lanceol.</i> | 1 |
| » — mimosæfolia . . . | 4 | — macrophylla . . . | 5 | <i>Portlandia hexandra</i> . . . | 5 |
| <i>or Jacquinia aurantiaca</i> . . . | 2 | — Strachoni . . . | 5 | <i>Posoqueria procera</i> . . . | 5 |
| <i>eo Jasminum ligustrifol.</i> | 1 | <i>Myrtus pimenta</i> . . . | 1 | <i>Prepusa Hookerii</i> . . . | 20 |
| » — Bidwellianum . . . | 2 | — Gregii . . . | 10 | <i>Puya Altensteinii</i> . . . | 5 |
| » — sambac fl. pleno . . . | 2 | — tomentosa . . . | 2 | <i>Raphistemma pulchell.</i> | 5 |
| » — simplicifolium . . . | 1 | <i>Napoleonica imperialis</i> . . . | 10 | <i>Rhodostoma gardenioid.</i> | 1 |
| — sps. fortune . . . | 5 | <i>Nauclea ovalifolia</i> . . . | 10 | <i>Rondeletia speciosa</i> . . . | 2 |
| <i>Jatropha curcas</i> . . . | 4 | <i>Nematanthus Guil-</i> | | — major . . . | 2 |
| — panduræfolia . . . | 4 | lelmianus . . . | 1 | — ignea . . . | 4 |
| <i>p t Juanilloa aurantiaca</i> . . . | 2 | <i>or — chloronema</i> . . . | 75 | <i>Rhopala elegans</i> . . . | 25 |
| <i>eo Justicia aurantiaca</i> . . . | 5 | » <i>Nepenthes distillatoria</i> . . . | 8 | — corcovadensis . . . | 50 |
| » — amabilis . . . | 1-50 | <i>Niphea fuscata</i> . . . | 1 | — Estrelensis . . . | 50 |
| » — carnea superba . . . | 1 | — oblonga . . . | 50 | <i>b Rosecea purpurea</i> . . . | 8 |
| » — coccinea . . . | 1 | <i>eo Oxalis Borelieri</i> . . . | 1-50 | <i>Ruellia glabrata</i> . . . | 50 |
| » — flavicoma . . . | 75 | — frutescens . . . | 1-50 | — macrophylla . . . | 1 |
| » — Ghiesbregtiana . . . | 2 | — sensitiva . . . | 2 | — maculata . . . | 1 |
| » — glabrata . . . | 50 | <i>Oxyanthus longiflorus</i> . . . | 1 | — montana . . . | 1 |
| » — Macdonaldi . . . | 2 | — tubiflorus . . . | 5 | — purpurea nova . . . | 1-50 |
| » — macrophylla . . . | 1 | <i>Palmiers (Voir plus loin.)</i> | | — villosa . . . | 1-50 |
| » — quadrifida . . . | 1 | <i>Panax arborea</i> . . . | 15 | <i>or Russellia juncea</i> . . . | 1 |
| » — sinensis . . . | 1 | <i>b Paneratum diverses</i> | | » — multiflora . . . | 1 |
| » — variabilis . . . | 2 | variétés à . . . | 5 | » — verticillata . . . | 1 |
| » — zebrina . . . | 2 | <i>Pandanus amaryllifolius</i> | | <i>Saccharum officinarum</i> . . . | 5 |
| <i>Lacepedea insignis</i> . . . | 5 | 10 à 25 | | <i>Sauraja macrophylla</i> . . . | 5 |
| <i>Lankesteria parviflora</i> . . . | 5 | — graminifolius . . . | 4 | — spectabilis . . . | 4 |
| <i>Laplacea serratifolia</i> . . . | 10 | — utilis . . . | 5 à 50 | <i>Sciodaphyllum pul-</i> | |
| <i>Lasiandra petiolata</i> . . . | 1 2 | <i>g Passiflora alata</i> . . . | 1 | chellum . . . | 10 à 40 |
| — splendens . . . | 1 | » — amabilis . . . | 5 | <i>Schubertia graveolens</i> . . . | 2 |
| <i>Laurus cinnamomum</i> . . . | 5 | » — aurantiaca . . . | 1 | <i>Schweiggeria paucifl.</i> | 1 |
| — glandulosum . . . | 4 | » — Bonapartia . . . | 1 | <i>b Sinningia floribunda</i> . . . | 1 |
| — glaucum . . . | 4 | » — cœrulea ramosa . . . | 1 | » — Hartwegii . . . | 1 |
| — nitidum . . . | 2 | » — difformis . . . | 2 | » — Hellerii . . . | 1 |
| <i>p t Lantana gigantea</i> . . . | 1 | » — edule . . . | 1-50 | » — velutina . . . | 1 |
| <i>Limonia spectabilis</i> . . . | 4 | » — laurifolia . . . | 1-50 | » — villosa . . . | 1 |
| <i>Lobelia serrata</i> . . . | 2 | » — Lemischieziana . . . | 1 | <i>e Sipanea carnea</i> . . . | 1 |
| <i>eo Luculia gratissima</i> . . . | 5 | » — Maximiliana . . . | 1 | <i>Siphonanthus hastatus</i> . . . | 1-50 |
| » — Pinceana . . . | 4 | » — Middletoni . . . | 1 | <i>e Siphocampylus nitidus</i> . . . | 1-50 |
| <i>Luxemburgia ciliosa</i> . . . | 10 | » — Kermosina . . . | 1 | <i>Solandra grandiflora</i> . . . | 1 |
| <i>Magnolia odoratissima</i> . . . | 5 | » — Skinnerii . . . | 5 | — guttata . . . | 1 |
| — pumila . . . | 2 | » — princeps . . . | 1-50 | <i>p t Solanum vellozianum</i> . . . | 2 |
| <i>Mandevilla suaveolens</i> . . . | 1 | — elegans . . . | 5 | <i>eo Spathodea gigantea</i> . . . | 10 |
| <i>g Manettia bicolor</i> . . . | 1 | — quadrangulare . . . | 1 | » — speciosa . . . | 15 |
| » — cordata . . . | 1 | <i>Pavetta indica</i> . . . | 2 | <i>g Stephanotes floribunda</i> . . . | 1-50 |
| » — miniata . . . | 2 | <i>or — borbonica</i> . . . | 25 | » — Thouarsi . . . | 5 |
| » — Monelli . . . | 2 | — cafra . . . | 5 | <i>Stiffitia chrysantha</i> . . . | 2 |
| » — Perrottetii . . . | 2 | <i>Petalidium barlerioid.</i> | 1 | <i>g Stigmatophyllum</i> | |
| — splendens . . . | 2 | <i>Pentarrhaphia cubensis</i> . . . | 2 | aristatum . . . | 1 |
| <i>Maranta zebrina</i> . . . | 2 | <i>Peliosanthes Teta</i> . . . | 2 | » — ciliatum . . . | 2 |
| <i>eo Marica cœruleo</i> . . . | 2 | <i>Pharbitis ostrina</i> . . . | 5 | » — heterophyllum . . . | 2 |
| <i>b Martynia perennis</i> . . . | 1 | <i>e Pinceneetitia tub.</i> | 5 à 50 | <i>Stachytarpheta arist.</i> | 4 |
| <i>Melastoma sanguineum</i> . . . | 1 | <i>e — glauca</i> . . . | 5 à 50 | <i>Streitzia augusta</i> . . . | 15 à 40 |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Strelitzia humilis . . . | 5 à 10 " | Tetranemamexicanum . . . | 50 " | Tillandsia splend. zo- | |
| — juncea . . . | 20 " | Tetranthera taurina . . . | 5 " | nata, <i>f. vertes</i> . . . | 4 " |
| — reginæ . . . | 8 à 15 " | Thecophrasta longifol. . . . | 15 " | Tradescantia discolor . . . | 50 " |
| — spatulata . . . | 20 " | — macrophylla . . . | 25 " | or— fuscata . . . | 2 " |
| Streptocarpus Rhexii . . . | 50 " | — jussieui . . . | 50 " | — zebrina . . . | 50 " |
| Swannaloia aurantiaca . . . | 2 " | — latifolia . . . | 6 " | Turraea lobata . . . | 5 " |
| Swiethenia mahogoni . . . | 10 " | gThunbergia chrysops . . . | 1 " | gTyiophora flavescens . . . | 1 " |
| Tacsonia incarnata . . . | 1 " | — aurantiaca . . . | 1 " | Urania specio a . . . | 50 " |
| — manicata . . . | 1 " | — fastuosa . . . | 1 " | Vellozia candida . . . | 15 " |
| — mollissima . . . | 1 " | — fragrans . . . | 1 " | Whitfieldia lateretia . . . | 2 " |
| Talauma candolli . . . | 5 " | — <i>sps. de la Havane</i> . . . | 1 " | Xanthochymus picto- | |
| — pumila . . . | 2 " | — coccinea . . . | 1 " | rius . . . | 5 " |
| Tamarindus indica . . . | 4 " | Tillandsia splendens . . . | 10 " | e Xyiophylla falcata . . . | 2 " |
| Terminalia procera . . . | 5 " | — zonata (Zebrina) <i>f.</i> | | — latifolia . . . | 5 " |
| Testudinaria elephan- | | — <i>brunes</i> . . . | 2 " | b Zingiber officinale . . . | 2 " |
| tipes . . . | 2 à 50 " | | | | |

CACTÉES.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Mamillaria acanthophl. . . . | 2 " | Mamill. Parkinsonii . . . | 10 " | Echinocactus cœspetic. . . . | 10 " |
| — acantostephes . . . | 6 " | — polythele . . . | 4 " | — centeterius . . . | 3 " |
| — aciculata . . . | 6 " | — quadrispina . . . | 5 " | — crispatus . . . | 5 " |
| — affinis . . . | 6 " | — recurva . . . | 5 " | — dolicoanthus . . . | 10 " |
| — Andræi . . . | 5 " | — retusa . . . | 10 " | — denudatus . . . | 10 " |
| — angularis . . . | 4 " | — Rhodanthe . . . | 2 " | — Eryesii . . . | 5 à 6 " |
| — aureiceps . . . | 4 " | — robusta . . . | 10 " | — equitans . . . | 50 " |
| — bicolor . . . | 5 à 25 " | — rosea . . . | 6 " | — erinaceus <i>tr.-fort.</i> . . . | 25 " |
| — candida . . . | 6 " | — setosa . . . | 4 " | — exculptus <i>fort.</i> . . . | 26 " |
| — caput medusæ . . . | 6 à 50 " | — Schelhasi . . . | 4 " | — electracanthus . . . | 10 " |
| — cirrhifera . . . | 2 " | — Seitziana . . . | 6 " | — formosus . . . | 55 " |
| — coronaria . . . | 5 à 15 " | — semperviva . . . | 6 à 50 " | — flavo-virens . . . | 55 " |
| — Celsiana . . . | 6 " | — Schiedeana . . . | 8 " | — flavispinis . . . | 2 " |
| — crocidata . . . | 10 " | — senilis . . . | 15 à 50 " | — — <i>très-fort</i> . . . | 50 " |
| — conopsia . . . | 5 " | — supertexta . . . | 6 " | — fossulatus <i>fort.</i> . . . | 50 " |
| — centrispina . . . | 10 " | — tetracantha . . . | 6 " | — gibbosus . . . | 4 " |
| — daymonoceras . . . | 4 " | — tentacullata . . . | 4 " | — grandicornis . . . | 10 " |
| — dedalea . . . | 5 à 20 " | — uberiformis . . . | 4 " | — halopteris . . . | 10 " |
| — elephantidens . . . | 15 " | — uncinata . . . | 5 " | — ingens . . . | 8 " |
| — Eugenia . . . | 4 " | — vetula . . . | 2 " | — irroratus <i>très-fort.</i> . . . | 80 " |
| — formosa . . . | 6 " | — versicolor . . . | 6 " | — Karswinskii <i>fort.</i> . . . | 50 " |
| — Fenneli . . . | 10 " | — webbiana . . . | 6 " | — Linkii . . . | 5 " |
| — Galleotti . . . | 5 à 40 " | — willddiana . . . | 2 " | — longimamma . . . | 40 " |
| — glochidiata . . . | 2 " | — Zuccarini . . . | 4 " | — lancifer . . . | 8 " |
| — gracilis . . . | 1 " | Anhalonium prismatic. . . . | 12 " | — macrodiscus <i>fort.</i> . . . | 50 " |
| — Guillelmiana . . . | 5 " | Astrophyton myrios- | | — Marisianus . . . | 25 " |
| — Haageana . . . | 8 " | tigma . . . | 10 " | — mammulosus <i>fort.</i> . . . | 20 " |
| — hystrix . . . | 8 à 20 " | Melocactus amœnus . . . | 6 " | — Monvillii . . . | 10 à 25 " |
| — hexacantha . . . | 8 " | — communis . . . | 10 à 25 " | — multiplex . . . | 5 à 4 " |
| — Karwinski . . . | 5 " | — violaceus . . . | 25 " | — micracantha . . . | 8 " |
| — Lehmannii . . . | 5 " | Discocactus alteolens . . . | 10 " | — Ottonis . . . | 2 " |
| — leucotricha . . . | 5 à 20 " | Echinocactus anfrac- | | — obvallatus . . . | 20 " |
| — longimamma . . . | 5 " | tuosus . . . | 5 " | — oxygonus . . . | 2 à 4 " |
| — Ludowigii . . . | 8 " | — acuatus . . . | 5 " | — Pentlandii . . . | 4 " |
| — loricata . . . | 5 " | — arrigens . . . | 10 " | — pumilus . . . | 2 " |
| — magnimamma . . . | 6 " | — Beslerii affinis . . . | 2 " | — platyacanthus . . . | 10 " |
| — nivea . . . | 5 " | — campylacanthus | | — porectus . . . | 8 " |
| — Ottonis . . . | 5 " | — <i>très-fort</i> . . . | 40 " | — recurvus . . . | 2 à 10 " |
| — obscura . . . | 4 " | — — <i>varietas</i> . . . | 40 " | — robustus . . . | 5 à 25 " |
| — phyllacantha . . . | 2 " | — concinnus <i>fort.</i> . . . | 25 " | — Reichenbachianus . . . | 12 " |
| — polyedra . . . | 5 " | — Couranti . . . | 10 à 25 " | — spiralis . . . | 2 " |
| — pycnacantha . . . | 4 " | — cornigerus . . . | 2 à 10 " | — solenacanthus . . . | 25 à 60 " |
| — pentacantha . . . | 10 " | — — <i>très-fort</i> . . . | 40 " | — Sellowianus . . . | 5 à 40 " |

Serre Chaude.

| | Fr. C. | | F. C. | | F. C. |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Echinocact. tetracantha | 8 » | Cereus chilensis | . 5 à 20 » | Cereus serpentinus | . 2 » |
| — tortuosus | . 5 » | — — varietas | . 5 à 20 » | — strigosus | . 2 » |
| — Williamsii | . 20 » | — caeruleus | . 2 » | — major | . 2 » |
| — xiphanthus | . 15 » | — Deppi | . 1 » | — scopa | . 4 à 25 » |
| Pelecophora asseliformis | . 20 » | — grandis | . 2 » | — — albis spinis | . 4 » |
| Pilocerus columnea | 15 à 20 » | — hystrix | . 2 » | Opuntia andicola | . 1 » |
| — senilis | . 40 » | — horridus | . 5 » | — canariensis | . 1 » |
| — militaris fort | . 500 » | — monstrosus | . 2 à 50 » | — crinifera | . 1 » |
| Lepismium paradoxum | 1 » | — multangularis | . 2 à 40 » | — leucantha | . 1 » |
| Cereus azureus | . 2 » | — Olfersii | . 2 » | — leucotricha | . 1 » |
| — Bonplandii | . 2 » | — pruinosis | . 8 » | — microdasys | . 1 » |
| — candicans | . 4 à 50 » | — Royenni | . 2 » | — senilis | . 1 » |

PALMIERS ET CYCADÉES.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Acrocomia aculeata | . 75 » | Chamærops humilis | 2 à 10 » | Oreodoxia acuminata | . 8 » |
| — sclerocarpa | . 4 » | — — fort, la couple | 150 » | — regia | . 5 à 20 » |
| Areca rubra | . 15 à 50 » | Cocos flexuosa | . 30 » | Pandanus amaryllifol. | 25 » |
| — sps. de Paraguay | . 40 » | — nucifera | . 20 » | — graminifolius | . 4 » |
| Arenga saccharif. | 20 à 100 » | — oleracea | . 6 à 40 » | — inermis | . 10 à 25 » |
| — guianense | . 40 » | Copernicia miraguama | 4 » | — utilis | . 5 à 50 » |
| Baetris flavispina | . 50 » | Corypha Gebanga fort | 500 » | — — fort | . 75 » |
| — setosa | . 50 » | — Miraguama | . 4 » | Phoenix dactylifera | . 5 à 40 » |
| — sps. Brasil | . 50 » | Cycas circinalis | . 50 à 100 » | — leonensis | . 50 » |
| Calamus equestris | . 50 » | — revoluta | . 8 à 15 » | — Sylvestris | . 10 » |
| — rudenda | . 50 » | — — fort | . 100 à 550 » | Pinex coronata | . 60 » |
| — oblongus | . 50 » | Dion edule | . 100 » | Rhapis flabelliformis | 2 à 10 » |
| — viminalis | . 50 » | — aculeatum | . 5 » | Sabal glaucescens | . 25 » |
| Carludovica funif. | 50 à 60 » | Drymophloeus Zippelii | . 25 à 75 » | — Adansonii | . 5 » |
| — latifolia | . 15 à 50 » | Elais guianensis | . 2 à 10 » | — Blackburniana fort | 125 » |
| — palmata | . 10 à 50 » | Elate Sylvestris | . 5 à 15 » | — pumila | . 10 » |
| Caryota Cumingii fort | 150 » | Fulchironia senegalen- | . 10 » | Scafortia elegans | . 150 » |
| — urens | . 20 à 50 » | — sis | . 10 » | Soribus rotundifolius | . 75 » |
| Ceratozamia mexicana | 15 » | Geonoma spixiana | . 25 » | Thrinax multiflora | . 10 » |
| Ceroxylon andicola | 20 à 50 » | — multiflora | . 15 » | — parviflora | . 5 » |
| Chamædora elatior | . 15 » | Jubæa spectabilis (Mo- | . 2 à 20 » | Zamia furfuracea | . 6 » |
| — elegans | . 25 » | — linia) | . 2 à 20 » | — muricata | . 15 » |
| — mexicana fort | 20 à 50 » | Latania borbonica fort | 100 » | — — picta | . 5 » |
| — Lindeniana | . 20 » | Maximiliana regia | . 5 » | — Mexicana | . 15 » |
| — Schiedeana | . 5 » | Orania regalis | . 55 » | — horrida | . 25 » |
| Chamærops excelsa | . 2 » | Oreodoxia oleracea | . 10 » | — spiralis | . 5 » |

ORCHIDÉES.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|
| Acanthophippium bicolor | . 10 » | Bifrenaria aureofulva | . 5 » | Brassia Lawrenceana | . 50 » |
| — sylhetense | . 5 » | — atropurpureum | . 4 » | — maculata | . 4 à 8 » |
| Acropera Loddigesii | . 2 » | Bletia acutipetala | . 5 » | — odorata | . 10 » |
| — luteolata | . 5 » | — gracilis | . 4 » | Broughtonia sanguin. | 15 » |
| Erides Brookii | . 50 » | — hyacinthina | . 5 » | Calanthe densiflora | . 6 » |
| — cornutum | . 40 » | — nova sps. | . 5 » | — flava | . 10 » |
| Angraecum distichum | . 5 » | Bolbophyll. carreyn. | . 5 » | — veratrifolia | . 10 » |
| — maculatum | . 5 » | — saltatorium | . 12 » | Camaridium imbricat. | . 2 » |
| Anguloa Clowesii | 100 » | Brassavola glauca | . 10 » | — ochroleucum | . 5 » |
| Anoctochilus setaceus | 40 » | — nova sps. | . 25 » | Catasetum luridum | . 5 » |
| — argenteus | . 5 » | — tuberculata | . 8 » | — maculatum | . 20 » |
| Habenaria Colleyi | 10 » | — venosa | . 6 » | — semiapertum | . 10 » |
| | | Brassia lanceana | . 10 » | — tridentatum | . 5 » |



| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Catasetum tridentatum | | Epidendrum fuscum | 6 | Maxillaria Parkerii | 5 |
| — Claveringi | 6 | — ferrugineum | 6 | — picta | 5 à 10 |
| Catleya citrina | 25 | — fragrans | 5 | — stapellioides | 5 |
| — alba | 10 | — glaucum | 5 à 15 | — squalens | 2 |
| — crispa | 10 | — macrochilum | 8 | — Warreana | 25 |
| — Forbesii | 5 à 6 | — oncioides | 6 | Megacelinium falcatum | 2 |
| — granulosa | 10 à 20 | — phœniceum | 5 | Miltonia candida | 50 |
| — guttata | 40 | — repens | 4 | — cruenta | 75 |
| — Mossiæi | 12 | — sphærocarpum | 5 | — Russelliana | 75 |
| — Skinnerii | 50 | — tibicinis | 15 | — Pinellii | 75 |
| — labiata | 50 | — varicosum | 5 à 15 | Normodes pardinum | 40 |
| Cirrhaea fuscolutea | 5 | — vitellinum | 40 | Myanthus cernuus | 25 |
| — viridi purpurea | 4 | Eulophia streptopetala | 4 | — barbatus | 15 |
| — warreana | 10 | Fernandezia acuta | 7 | Neottia picta | 2 |
| Cœlia Baueriana | 5 à 10 | Galeandra Baueri | 50 | — speciosa | 4 |
| Colax Harrisoniæ | 4 à 10 | Gomezia recurva | 15 | Odontoglossum bicto- | |
| Coryanthes maculata | 50 | Gongora atropurpurea | 10 | — niense | 25 |
| — speciosa | 10 | — maculata | 10 | — Cervantesii | 10 |
| Cyanoches chlorochilon | 15 | — fulva | 6 | — citrosimum | 15 à 50 |
| — Loddigesii | 50 à 60 | — viridi purpurea | 10 | — galeottianum | 20 |
| Cymbidium aloifol. | 2 | Goodyera discolor | 2 | — elatum | 15 |
| — ensifolium | 2 | Govenia superba | 8 | — grande | 15 à 25 |
| — marginatum | 10 | — lilacea | 10 | — hastatum | 5 à 20 |
| — sinense | 2 à 5 | Hartwegia purpurea | 12 | — membranaceum | 10 à 25 |
| — stapelioides | 5 | Heterotaxis crassifolia | 5 | — pulchellum | 15 |
| — pendulum | 2 | Houlletia Brocklehurs- | | | |
| Cypripedium insigne | 2 à 4 | — tiana | 55 | — superbum | 20 |
| — irapeanum | 50 | Huntleya violacea | 20 à 40 | — Rossii | 25 |
| — purpuratum | 10 | Lælia acuminata | 20 | Oncidium altissimum | 5 |
| — venustum | 2 | — albida | 10 | — ampliatum | 8 à 20 |
| Cyrtochilon floribund. | 10 | — anceps | 10 | — bicolor | 20 |
| — filipes | 10 | — — Barkeriana | 15 à 50 | — bifolium | 15 |
| — hastatum | 5 à 20 | — autumnalis | 15 | — brachyphyllum | 8 |
| — maculatum | 10 | — cinnabarina | 10 | — Cavendishianum | 15 |
| — stellatum | 6 | — maialis | 50 | — cebolleta | 5 |
| Cyrtopodium Andersoni | 8 | — violacea | 20 | — citrinum | 5 à 10 |
| — flavum | 8 | Leptotes bicolor | 10 | — columbæ | 10 |
| — speciosissimum | 10 | Limodorum Tanker- | | — crispum | 10 à 50 |
| Dendrobium aggregat. | 10 | — villæ | 2 | — deltoideum | 10 à 20 |
| — buxifolium | 5 | Lissochilus speciosus | 5 | — divaricatum | 10 |
| — Barringtoni | 5 | Lycaste aromatica | 5 à 6 | — flexuosum | 5 |
| — calceolaria | 10 | — Barringtoniæ | 5 | — Funckii | 10 |
| — chrysanthum | 20 | — Deppii | 5 à 10 | — Geertiana | 20 |
| — cucullatum | 5 | — major | 20 | — Harrisoniana | 5 à 10 |
| — densiflorum | 15 | — Heyndericksii | 25 à 50 | — incurvum | 55 |
| — fimbriatum | 10 | — Skinneri | 50 | — juncifolium | 5 |
| — formosum | 50 | — — alba | 15 | — lanceanum | 20 |
| — moniliforme | 15 | — — hastata | 15 | — leucochilum | 25 |
| — nobile | 8 à 20 | — — insignis | 15 | — luridum | 10 |
| — speciosum | 5 | — — leucochila | 15 | — macropterum | 5 à 10 |
| — humile | 5 | — — picturata | 15 | — microchilum | 10 |
| — squalens | 2 | — — punctata | 15 | — monoceras | 10 |
| Dierpht Baueri | 5 | Macradenia lutescens | 5 | — obsoletum | 10 à 50 |
| Dinema polybulbon | 2 | Maxillaria aromatica | 5 à 6 | — ornatum | 20 |
| Eneclæum adenocar- | | — atropurpurea | 5 | — pachyphyllum | 15 |
| — pum. | 10 | — aurantiaca | 15 | — papilio | 15 |
| Epidendrum ciliare | 5 | — atrorubens | 2 | — pumilum | 5 |
| — cinnabarinum | 15 | — balsamea | 25 | — pulvinatum | 5 à 10 |
| — cocleatum | 2 à 4 | — decolor | 5 | — raniferum | 8 |
| — Loddigesii | 4 | — densa | 2 à 6 | — sanguineum | 20 |
| — — grandiflorum | 5 | — Deppii | 5 à 10 | — sciurus | 25 |
| — ellipticum | 2 | — galeata | 2 | — sphacelatum | 10 |
| — elongatum | 2 à 5 | — Harrisonii | 4 à 10 | — stramineum | 10 |
| — erubescens | 40 | — ochroleuca | 5 | — unicolorne | 10 |
| | | | | — — macropetalum | 5 |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Ornithidium coccineum | 8 » | Sophronites pterocarpa | 20 » | Stanhopea tigrina | 10 » |
| Peristeria Barkerii | 10 » | Spiranthes Lindleyana | 25 » | — — superba | 25 » |
| — elata | 10 » | Stanhopea bucephalus | 25 » | — — nigro purpurea | 25 » |
| — longiscapa | 15 à 50 » | — aurantiaca | 20 » | — Wardi | 10 » |
| — pendula | 10 » | — calceolata | 4 à 8 » | Stelis micrantha | 12 » |
| Phajus albus | 20 » | — Devoniensis | 20 » | Stenorhynchus speciosus | 4 » |
| — grandiflorum | 2 » | — eburnea | 4 à 8 » | Trichopelia tortilis | 10 » |
| — Wallichii | 20 » | — ecornuta | 75 » | Vanda multiflora | 15 » |
| — Woodfordii | 4 » | — grandiflora | 6 » | — rostrata | 5 » |
| Pholidota imbricata | 5 » | — graveolens | 50 » | — Roxburgii | 40 » |
| Pleurothallis racemifl. | 10 » | — alba | 40 » | — teres | 50 » |
| — lingua | 15 » | — aurata | 50 » | — teretifolia | 5 à 10 » |
| Renanthera coccin. | 20 » | — guttata | 20 » | Vanilla aromatica | 2 à 5 » |
| Rodriguezia Barkeri | 5 à 6 » | — aurea | 15 » | — planifolia | 2 » |
| — secunda | 15 » | — insignis | 4 à 8 » | Warrea cyanea | 25 » |
| Saccalobium papillosum | 20 » | — inodora punctata | 25 » | — tricolor | 25 » |
| Sarcanthus rostratus | 5 » | — Martiana | 40 » | Xylobium atropurpur. | 5 » |
| — teretifolia | 5 à 10 » | — oculata | 5 à 15 » | — squalens | 2 » |
| Schomburgkia tibicinis | 15 » | — Barkerii | 20 » | Zygopetalum crinitum | 8 » |
| — grandiflora | 20 » | — pallida | 10 » | — cæruleum | 8 » |
| Sobralia macrantha | 15 » | — Parmentieri | 15 » | — intermedium | 5 » |
| — decora | 40 » | — quadricornis | 55 » | — Mackayi | 6 » |
| — sessiliflora | 40 » | — Ruckerii | 20 » | — maxillare purpurea | 15 » |
| Sophronites cernua | 15 à 25 » | — saccata | 15 » | — stenochilum | 5 » |

FOUGÈRES.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Acrosticum alcornorae | 1-50 » | Blechnum gracile | 1-50 » | Lycopodium umbrosum | 5 » |
| — conforme | 4 » | — microphylla | 2 » | — vulgare | 50 » |
| — flagelliferum | 5 » | — pectinatum | 1 » | Marattia macroph. | 10 à 50 » |
| — scandens | 5 » | — rufescens | 2 » | Microsorium irregulare | 2 » |
| Adiantum aethiopic. | 1 » | — squamosa | 2 » | Nephrodium exaltatum | 1 » |
| — Brasiliense | 2 » | — tomentosa | 2 » | — Davallioides | 2 » |
| — cuneatum | 1 » | Ceropterys sulphurea | 1 » | — ottonis | 1-50 » |
| — formosum | 1-50 » | Cheilanthes Brasiliens. | 2 » | — pectinatum | 1-50 » |
| — pubescens | 50 » | — chlorophylla | 2 » | — tuberosum | 1 » |
| — trapeziforme | 2 » | — Dicksonioides | 1 » | Niphebolus lingua | 2 » |
| Ancimia densa | 1-50 » | — squamosa | 1-50 » | Notholaena nivea | 1 » |
| — laciniata | 1 » | — tomentosa | 1 » | — rufa | 1 » |
| — phyllitidis | 2 » | Dicksonia gracilis | 2 » | — tenera | 1 » |
| Allantodia umbrosa | 5 » | — rubiginosa | 2 » | Physematum incisum | 2 » |
| Allosurus sagittatus | 2 » | — Shepherdii | 4 » | Polypodium aureum | 2 » |
| — flexuosus | 2 » | — tenera | 2 » | — dimorphum | 5 » |
| Alsophila compacta. | 50 » | Diplazium lasiopteris. | 2 » | — Labillardieri | 1 » |
| Aspidium augeascens | 1 » | — obtusum | 2 » | — lanatum | 1-50 » |
| — falcatum | 2 » | — plantagineum | 2 » | — phyllitidis | 2 » |
| — fraxinifolium | 1-50 » | Gymnogramma Calo- | | — sporodocarpum | 5 » |
| — Kaulfussii | 1 » | — melanos | 1 » | — repandum | 1 » |
| — molle | 1 » | — distans | 2 » | — repens | 1 » |
| — paludosum | 1-50 » | — chrysophyllum | 2 » | Pteris calomelanos | 1 » |
| — violaceus | 1 » | — Lherminieri | 5 » | — cordata | 1 » |
| Asplenium auritum | 2 » | — Martensii | 2 » | — denticullata | 1 » |
| — dissectum | 2 » | — tartareum | 2 » | — lata | 2 » |
| — ebenum | 1 » | — tomentosum | 2 » | — memoralis | 1-50 » |
| — marinum | 1 » | Lomaria Gilliesii | 2 » | — longifolia | 50 » |
| — Hallerii | 2 » | — minor | 1-50 » | — reflexa | 2 » |
| — triste | 1 » | Lycopodium caesium | 1 » | — serrulata | 50 » |
| Blechnum Brasiliense. | 5 » | — stoloniferum | 50 » | Scolopendrium diversif. | 1 » |

FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Adiantum Capillus ven. | 1 » | Echeum occidentale. | » 50 | Osmunda regalis | 1-50 |
| Allosurus atropurpur. | 1 » | Cheilanthes crenulata. | 2 » | Physmatium hyper- | |
| Ancimia densa | 1 » | — Dicksonoides | 2 » | boreum. | 1 » |
| Aspidium acrostichoides | 1 » | — micropterys. | 1 » | — molle. | 1 » |
| — lobatum | 1 » | — microphylla. | 1 » | — perrinianum | 1 » |
| — proliferum | 2 » | — multifida. | 1 » | Polypodium caespitos. | 1 » |
| — pungens | 1 » | — pteridioides | 1-50 | Pteris arguta. | 2 » |
| — Thelypteris | 1 » | — rufescens. | 1 » | — calomelanos. | 1 » |
| Asplenium ebum | » 50 | Davallia canariensis | 1-50 | — falcata | 1 » |
| — decurtatum | 2 » | Doodya aspera | 2 » | — ternifolia | 1 » |
| — flabellifolium | 1 » | — rupestris. | » 50 | Tectaria coriacea | 2 » |
| — marinum | 1 » | Mohria thurifera | 1 » | Woodwardia radicans | 5 » |
| — trichomanes. | 1 » | | | | |

SERRE FROIDE.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|------------------------------------|---------|---|---------|---------------------------------------|------------|
| Abelia floribunda | 1 » | Acacia virgata | 2 » | Angelonia (Voir serre | |
| — rupestris. | 1 » | — 4 nouvell. espèces, | | chaude). | |
| Abutilon arboreum. | 1 » | la pièce à | 5 » | Anthocercis albicans | 1 » |
| — aurantiacum | 1 » | Achimenes (V. serre | | Aotus lanigera | 2 » |
| — Bedfordianum | 1 » | chaude). | | — villosa | 2 » |
| — coccineum | 1-50 | Adenandra glauca | 5 » | Aralia crassifolia | 15 » |
| — esculentum | 1 » | Agave filifera. | 8 à 50 | — Shefferiae. | 10 » |
| — giganteum | 1 » | — autres belles va- | | — sambucina | 5 » |
| — pæoniflora | 1 » | riétés de | 2 à 5 | — trifoliata | 8, 50 à 75 |
| — striatum | » 50 | Agapanthus maximus | 15 » | Araucaria (V. plus loin | |
| — venosum | 1 » | Anigiosanthus coccin. | 1 » | aux Conifères). | |
| Acacia albicans | 5 » | — flavidus | 1 » | Arbutus canariensis | 5 » |
| — conspicua | 2 » | Agnostus integrifolia | 25 » | — farinosa | 2 » |
| — cultiriformis. | 2 à 5 » | — sinuata | 25 » | — longifolia | 5 » |
| — cyanophylla. | 5 » | Aloe , plusieurs belles | | — mucronata | 1-50 |
| — ciliaris | 1 » | variétés de | 1 à 5 » | — procera | 5 » |
| — dealbata | 2 » | Alona caelestis | 1 » | — pillosa | 2 » |
| — dolabriformis | 2 à 5 » | Alstræmeria acutifolia | 2 » | — salicifolia | 5 » |
| — Douglasii. | 1-50 | — aurea | » 50 | — tomentosa | 4 » |
| — glaucescens | 4 à 6 » | — brasiliensis | 1-50 | — unedo. | 1 » |
| — hispida | 1 à 5 » | — Errebaulti. | 1 » | Arunda donax fol. var. | 2 » |
| — Hugelii | 2 » | — Hookerii | 1-50 | Arthropodium cirrhat. | 1 » |
| — juniperina | 2 » | — oculata | » 50 | Astelia Banksii | 1 » |
| — longissima glauca | 1 à 5 » | — odorata rosea | 10 » | Babingtonia campho- | |
| — macrophylla | 20 » | — du Chili en mélange | | rosma | 5 » |
| — nitida | 5 » | bien variée, les 25 9 » | | Banksia æmula | 5 » |
| — pendula | 2 » | Amaryllis Belladonna | 1 » | — australis | 2 » |
| — paradoxa | 1 » | — crispa. | » 50 | — attenuata | 15 » |
| — varietas | 1 » | — curvifolia | » 50 | — brunioides | 15 » |
| — platyptera | 2 » | — formosissima | » 50 | — Brownii | 25 » |
| — pubescens | 2 » | — Josephinæ très-fort | 20 » | — Calleyi | 25 » |
| — pulchella. | 2 à 4 » | — purpurea. | 1 » | — dryandroides | 10 » |
| — magna | 2 à 4 » | — vittata | 1-50 | — Drummondii | 10 » |
| — præmorsa | 2 à 4 » | Andersonia spreng- | | — grandis | 10 » |
| — ova'a | 5 » | lioides | 2 » | — ericæfolia | 5 » |
| — rotundifolia | 5 » | Andromeda buxifolia | 1 » | — Goodii | 10 » |
| — sub cæruleo. | 6 » | — floribunda | 5 » | — integrifolia | 5 » |
| — scolopendria | 2 » | — sinensis | 5 » | — latifolia | 8 » |
| — squamata | 5 » | Anemone arborea | 15 » | — littoralis | 5 » |
| — vestita | 2 » | Anemotheca cruenta | » 50 | — marescens | 5 » |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---------------------------------------|---------|--|--------|---|---------|
| Banksia nutans | 4 » | Bossia disticha villosa | 5 » | Chorisma pillosum | 5 » |
| — Menziesii | 40 » | — cordifolia | 10 » | — spectabile | 50 » |
| — oblongifolia | 4 » | — rufa | 1 » | — triangulare | 4 » |
| — occidentalis | 5 » | — thymifolia | 75 » | — varium | 1 » |
| — paludosa | 4 » | — linophylla | 5 » | — elegans | 1 » |
| — prostrata | 20 » | Bouvardia coccinea | 1 » | — rotundifolia | 1 » |
| — proteoides | 15 » | — aurantiaca | 2 » | Chrysorrhæ nitens | 5 » |
| — quercifolia | 15 » | — flava | 1 » | Cineraria (v. plus loin aux spécialités.) | |
| — repens | 20 » | — strigosa | 1 » | Cissus heterophylla fo- | |
| — serrata | 5 » | — triphylla | 2 » | liis variegatis | 50 » |
| — speciosa | 15 » | Brachysema hybridum | 2 » | Citrus australis | 1-50 |
| — spinulosa | 5 » | — latifolium | 2 » | — sinensis | 2 » |
| — sphaerocarpa | 10 » | — platypterum | 2 » | — aurantium, <i>Oran-</i> | |
| — verticillata | 4 » | — undulatum | 1 » | gers en plusieurs | |
| Barleria buxifolia | 1 » | — villosum | 10 » | variétés, belle cou- | |
| Beaufortia decussata | 1 » | Brugmansia arbuscula | 1 » | ronnée avec fruit 5 à 8 » | |
| — splendens | 1 » | — Knightii | 1 » | Clematis azurea grand. | 1 » |
| Besleria coarctata | 25 » | Brunswigia Josephinæ | 20 » | — aristata | 2 » |
| — ledifolia | 25 » | Buddleia Lindleyana | 50 » | — bicolor | 1 » |
| Benthamia sps. nova | | Burchella capensis | 1 » | — calycina | 1 » |
| — Zelandica | 1 » | — præcox | 5 » | — smilacifolia | 1 » |
| Berberis angulosa | 5 » | — speciosa | 1 » | — trifoliata | 2 » |
| — auruhacensis | 3 à 6 » | Burtonia brunioides | 3 » | — tubulosa mongolica | 1 » |
| — Fortunei | 10 » | — conferta | 5 » | Cleyera japonica | 5 » |
| — petiolaris | 6 » | — violacea | 5 » | Clerodendron splend. | |
| — trifoliata | 5 » | Calandrinia umbellata | 2 » | (Hugel) | 1 » |
| — pangharanghiensis | 10 » | Calceola de semis | | Clethra arborea | 1 » |
| — tenuifolia | 5 à 8 » | extra, le cent | 20 » | — foliis variegatis | 1 » |
| Blignonia australis | 1 » | Callistachys lanceolata | 1 » | — macrophylla | 4 » |
| — capensis | 1 » | — ovata | 1 » | Clinanthus puniceus | 1 » |
| — capreolata | 75 » | — longifolia | 1 » | Cnidanthus fragrans, | |
| — jasminoides | 50 » | Caliphuria Hartwe- | | les 12 | 6 » |
| — rosea | 2 » | giana | 5 » | Clivia nobilis | 2 à 8 » |
| — Manglesii | 1 » | Calothamnus sanguin. | 2 » | Cobæa scandens | 1 » |
| — picta | 1 » | — longissima | 5 » | Coburgia flava | 1 » |
| — Pandoræ | 1 » | Calystegia pubescens | 2 » | Cœlobogyne ilicifolia | 1 » |
| — schinifolia | 1 » | Camellia (voir aux col- | | Colconema alba | 1 » |
| — stans | 1 » | lections spéciales.) | | — rubra | 1 » |
| — foliis incis. | 5 » | Canna indica | 50 » | Colletia serratifolia | 1 » |
| — Tweediana | 1 » | — foliis variegatis | 1 » | Comarostaphylis ar- | |
| — venusta | 1 » | — violacea | 75 » | butioides | 5 » |
| Bladhia Japonica | 1 » | Canarina campanula | 2 » | Conyza argentea | 5 » |
| Blandfordia nobilis | 8 » | Cantua bicolor | 5 » | Corœcia budleoides | 2 » |
| — grandiflora | 15 » | Cassia ligustrina | 1 » | Comesperma gracilis | 1 » |
| — marginata | 6 » | Ceanothus albiflorus | 1 » | Convolvulus canariens | 1 » |
| Bonapartia gracil. 5 à 100 » | | — divaricatus | 1 » | Correa alba | 50 » |
| — une couple | | Centradenia rosea | 1 » | — Alexandria | 5 » |
| très-fort. | 600 » | Chenostoma polyanth. | 75 » | — ampullacea | 1 » |
| — juncea, la couple | 10 » | Chamerops humilis 2 à 10 » | | — bicolor | 1 » |
| — idem, très-fort la | | Chironia frutescens | 1 » | — bijou (Henderson) | 2 » |
| couple | 125 » | — floribunda | 1 » | — Cavendishii | 1 » |
| — filamentosa | 6 » | — glutinosa | 2 » | — cerise | 1-50 |
| — hystris | 100 » | — linifolia | 50 » | — color dillacca | 1-50 |
| Boronia alata | 2 » | — trinerva | 1 » | — elegans | 1-50 |
| — anemonæfolia | 2 à 5 » | Chorisema cordatum | 1 » | — maxima | 1 » |
| — crenulata | 1 à 3 » | — Dicksonii | 2 » | — diomede | 2 » |
| — denticulata | 1 » | — ericoides | 2 » | — Goodii | 1 » |
| — ledifolia | 5 » | — Henchmanii | 2 » | — Grevillei | 50 » |
| — pinnata | 2 à 8 » | — Hugelii | 5 » | — formosa | 2 » |
| — Fraserii | 2 à 3 » | — Lawrenceana | 2 » | — Harrissii | 1 » |
| — polygalæfolia | 4 » | — mucronatum | 1 » | — Lindleyana | 1 » |
| — serrulata | 5 à 5 » | — macropetala | 1 » | — longiflora | 1 » |
| — triphylla | 5 » | — oppositifolium | 2 » | — Miller's triumphans | 1-50 |
| — viminea | 1 » | — ovatum | 5 » | | |



| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|-------------|--------------------------------------|-----------|--|---------|
| Correa Magnet | 2 » | Diosma purpurea | 1 » | Epacris pulchella | 5 » |
| — mutabilis | 1-50 | — speciosa | 1 » | — Rædii | 5 » |
| — nec plus ultra | 1-50 | Distemma aurantiaca | 1 » | — Rollissonii | 4 » |
| — oecoleuca | 1-50 | Doryanthes excelsa 12 à 20 » | | — Storyana | 5 » |
| — rosea | 1 » | Dracophyllum capit. 2 à 5 » | | — Tauntoniensis | 5 » |
| — elegans | 2 » | — gracile | 5 à 6 » | — variabilis | 5 » |
| — rufa | 1 » | — Hugeli | 15 » | — willmoreana | 2 à 4 » |
| — rubra multiflora | 1-50 | — secundum | 2 à 4 » | Ericas en 12 belles es- | |
| — superba nova | 5 » | Dryandra armata | 5 à 10 » | pèces en belles | |
| — Stockwelliana | 1 » | — Baxterii | 10 » | plantes à mon | |
| — speciosa | 1 à 2 » | — cuneata | 10 » | choix | 50 » |
| — major | 1 à 2 » | — elegans | 20 » | — en 25 espèces très | |
| — speciosissima | 1 » | — floribunda | 8 » | belles | 50 » |
| — turgida | 1 » | — formosa | 5 à 20 » | Eranthemum albiflor. | 2 » |
| — tricolor | 1-50 | — Fraserii | 20 » | Erinus lychnoides | 1 » |
| Crowea canaliculata | 5 » | — nervosa | 20 » | Eriostemon buxifol. | 5 » |
| — latifolia | 2 à 4 » | — nivea | 20 à 40 » | — cuspidatus | 4 » |
| — saligna | 1 à 4 » | — nobilis | 15 » | — intermedius | 10 » |
| Cuphea cordata | 1-50 | — speciosa | 15 » | — myoporoides | 5 » |
| — floribunda | 1 » | — tenuifolia | 15 » | — scaber | 5 » |
| — miniata | 1 » | Echeveria fulgens | 1 » | Erodium incarnatum | 2 » |
| — platycentra | 1 » | — gibbiflora | 2 » | Erythrina cristagalli | 1 » |
| — strigulosa | 50 | — pumila | 50 | — Humei | 5 » |
| Cunonia capensis | 5 » | — secunda | 50 | — herbacea | 2 » |
| Cyclamen coum. | 1 » | Embothrium speciosis- | | — laurifolia | 1 » |
| — Europæum | 1 » | simum | 20 » | — picta | 5 » |
| — persicum | 1 » | Enkianthus quinque- | | — versicolor | 1 » |
| — striatum | 2 » | florus | 5 à 10 » | Escallonia montevidense | 1 » |
| Cypella Herberti | 1 » | — reticulatus | 5 à 10 » | — grandiflora | 5 » |
| Cyrtanthus obliquus | 5 » | — undulatus | 8 » | Euchilus obcordatus | 5 » |
| Cytisus speciosus | 2 » | Epacris attenuata | 2 à 4 » | Eutaxia Baxterii | 1 » |
| — elegans | 1 » | — rosea | 4 » | — myrtifolia | 75 » |
| — Filipes | 2 » | — Atleana | 2 à 4 » | — pungens | 2 » |
| — lucidus | 1 » | — aurantiaca | 5 » | Euthates macrophylla | 1 » |
| Daphne Aucklandiæ | 2 » | — autumnalis | 5 » | Euonymus fimbriatus | 1 » |
| — cneorum fol. marg. | 1 » | — campanulata alba 2 à 4 » | | Forsythia viridissima | 1 » |
| — maximum | 1 » | — rubra | 2 » | Fortunea sinensis | 15 » |
| — collina latifolia | 1-50 | — grandiflora | 4 » | Ficus diversifolia | 2 » |
| — dauphin | 1-50 | — ceræflora | 5 à 6 » | Freyenetia Baueriana | 50 » |
| — Fortunei | 10 » | — coccinea (Low) | 8 » | Fuschia , (v. plus loin | |
| — indica | 1 à 5 » | — Copelandii | 5 » | aux spécialités.) | |
| — rubra | 1-50 | — coruscans | 4 » | Gardoquia Hookerii | 75 » |
| — Japonica | 2 » | — carnea umbrata | 4 » | Garraya elliptica | 1 » |
| — luteiciana | 1 » | — elegantissima | 4 » | — laurifolia | 5 » |
| — sps. foliis atropur- | | — formosa | 4 » | Gastrolobium bilobum | 2 » |
| pureis | 2 » | — grandiflora | 1 à 5 » | — Brownii | 5 » |
| Daviesia cornuta | 2 » | — incarnata | 2 » | — mucronatum | 5 » |
| — cordata | 20 » | — hyacinthiflora | 5 » | — epacrioides | 5 » |
| — Fraserii | 4 » | — heteronema | 1 à 2 » | — obtusum | 5 » |
| — latifolia | 4 » | — Hoppeana | 5 » | — pubescens | 5 » |
| — mimosoides | 2 » | — impressa | 1 à 5 » | — retusum | 4 » |
| Dianella cœruleo | 1 » | — alba | 4 » | — spinosum | 2 à 6 » |
| Dianthus arborea | 5 » | — coccinea (Rol- | | Gaylussacia rosea | 10 » |
| Dillwynia cinerascens | 2 » | lisson) | 6 » | Glycine (wistaria) Back- | |
| — clavata | 2 » | — lævigata | 2 à 6 » | housiana | 2 » |
| — ericæfolia | 2 » | — longiflora | 5 » | — rosea de Ceylan | 5 » |
| — flavesces | 2 » | — miniata | 2 » | Genista Atleana | 1 » |
| — glycinæfolia | 2 » | — microphylla | 5 » | Geraniums (v. plus loin.) | |
| — gompholoides | 2 » | — mucronata | 5 » | Gnaphallum eximeum | 5 » |
| — juniperina | 2 » | — nivalis | 2 à 4 » | Gnidia pinifolia | 1 à 5 » |
| — rudis | 2 » | — onosmæflora | 2 à 4 » | Gompholobium Drum- | |
| Dionea muscipula | 5 » | — purpureum | 5 » | — mondi | 5 » |
| Diosma amœna | 1-50 | — pungens | 2 à 4 » | — ericoides | 2 » |
| — ambigua | 50 c. à 1 » | — paludosa | 1 » | — lanatum | 2 » |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| Compholobium lobatum | 10 " | Hydrangea alternifolia | 4 " | Laurus glandulosa | 4 " |
| — polymorphum | 5 " | — involucrata | 10 " | — glauca | 4 " |
| — — varietas | 5 " | Hypericum ægypticum | 50 " | — salicifolia | 5 " |
| — tenellum | 5 à 5 " | Hypocalymna alba | 2 " | Leianthus nigrescens | 2 à 4 " |
| — versicolor | 8 " | Ilex castaneifolia | 2 " | Leiospermum race- | |
| — virgatum | 10 " | — crassifolia | 1 " | mesum | 10 " |
| Goodia lotifolia | 1 " | — Cunninghamii | 5 " | — speciosum | 20 " |
| Goodenia ovata | 1 " | — Denhamii | 5 " | Leschenaultia Baxteri | 1 " |
| Gordonia anomala (ca- | | — excelsa | 5 " | — arcuata | 5 " |
| mellia axillaris) | 2 " | — latifolia | 2 à 10 " | — biloba | 1 " |
| — pubescens | 5 " | Illicium anisatum | 1 " | — — mutiflora | 2 " |
| Grevillea acanthifolia | 2 " | — floridanum | 1 " | — formosa | 50 " |
| — absinthifolia | 1 " | — parviflorum | 1 " | — Drummondii | 1 " |
| — argentea | 6 " | — religiosum | 2 à 5 " | — splendens | 5 " |
| — bipinnatifida | 10 " | Imatophyllum Aitonii | 2 à 8 " | — oblata | 50 " |
| — cernatophylla | 2 " | Indigofera decora | 2 " | Leucopogon amplexi- | |
| — longifolia | 6 " | Iocroma tubulosa | 1 " | caulis | 5 " |
| — Drummondii | 1 " | Iris bicolor | 10 " | — juniperina | 5 " |
| — ferruginea | 2 " | — moreoides | 2 " | Libertia azurea | 1 " |
| — linearis | 1 " | Isopogon Loudonii | 4 à 20 " | — formosa | 50 " |
| — Manglesii | 1 " | — longifolius | 4 " | Lindleya mespiloides | 5 " |
| — robusta | 6 à 15 " | — pulchellus | 2 " | Liparia spherica | 2 " |
| Guevina avellana | 5 " | — nova sps. | 5 " | Lichnis Fortuni | 1 " |
| Guncera scabra | 5 " | Jasminum azoricum | 1 " | Lobelia discolor | 1 " |
| Habrothamnus cyanescens | 1 " | — Bidwelliana | 1 " | — unidentata | 50 " |
| — elegans | 1 " | — gracile | 1 " | Lomatia illicifolia | 5 " |
| — fasciculatus | 1 " | — — foliis varieg. | 1-50 " | — longifolia | 2 " |
| Hardenbergia digitata | 1 " | — heterophyllum | 1 " | Lophospermum Hen- | |
| — macrophylla | 2 " | — simplicifolium | 1 " | dersoni | 50 " |
| Hakea aculeata | 2 " | — sps. nova | 5 " | Luculia gratissima | 5 " |
| — Baxterii | 2 " | — wallichianum | 1 " | — Pinceana | 4 " |
| — elliptica | 2 " | Justicia quadrifida | 1 " | Lisianthus Russellian. | 2 " |
| — latifolia | 2 " | Kadsura japonica | 1 " | Lycium fuchsioides | 1 " |
| — longifolia | 5 " | Kennedyia audomaren. | 1 " | Magnolia fuscata | 2 " |
| — lambertia | 2 " | — bimaculata | 1 " | — grandiflora | 2 " |
| — macrocarpa | 2 " | — — rosea | 1 " | — — præcox | 5 " |
| — nova sps. | 5 " | — coccinea (tricolor) | 1 à 2 " | — Hartwicus | 4 " |
| — saligna | 1 " | — carinata | 1 " | — sps. de la Chine | 4 " |
| Helichrysum humile | 50 " | — eximea | 5 " | — pumila | 2 " |
| — faciculatum | 50 " | — glabrata | 1 " | Mahonia tenuifolia | 5 à 8 " |
| — proliferum | 1 à 5 " | — gracilis | 1 " | — trifoliata | 5 " |
| — speciosum | 2 " | — inophylla | 1 à 2 " | Malva campanulata | 1 " |
| — superbum | 2 " | — Marriatæ | 2 " | — Towardii | 1 " |
| Hechtia planifolia | 6 " | — microphylla | 5 " | Mandevillia suaveolens | 1 " |
| Heliotropium Voltair. | 75 " | — molle | 5 " | Manettia bicolor | 1 " |
| — — triumphe de Liège | 75 " | — nigricans | 1 " | — cordata | 1 " |
| Hibiscus cameronis ful- | | — ovata | 1 " | — miniata | 2 " |
| gens | 2 " | — pannosa (Zichya) | 4 " | Marianthus cæruleus | |
| — multifidus | 75 " | — rotundifolia | 5 " | punctatus | 2 " |
| Hibbertia volubilis | 75 " | — rubicunda superba | 1 " | Megosea ciliata alba | 1 " |
| Holtzia coccinea | 1 " | — Stirlingi | 1 " | Metrosideros albidus | 5 " |
| Houstonia cœrulea | 50 " | — tricolor (Zichya) | 4 " | — buxifolia | 1 " |
| Hovea apiculata | 20 " | — villosa | 5 " | — speciosa | 4 " |
| — Celsi | 2 " | Knightia excelsa | 15 " | — semperflorens | 1 " |
| — elliptica | 6 " | Lachnea eriocephala | 2 à 4 " | — robusta | 1 " |
| — illicifolia | 10 " | — purpurea | 2 à 4 " | Mirbella Baxteri | 2 " |
| — — glauca | 10 " | Lalage ornata | 15 " | — dililita | 2 " |
| — Manglesii | 5 " | — thymifolia | 10 " | — illicifolia | 2 " |
| — mucronata | 10 " | Lambertia ericæfolia | 2 " | — reticulata | 1 à 5 " |
| — pannosa | 5 " | — formosa | 2 " | — grandiflora | 5 " |
| — pungens | 2 à 10 " | — olæfolia | 5 " | — rubifolia | 2 " |
| — — major | 2 à 10 " | Lasiopetalum dumos. | 50 " | — speciosa | 5 " |
| — purpurea | 5 à 5 " | — argenteum | 5 " | Muraltia heisteri | 1 " |
| Hydrangea altissima | 2 " | Laurus camphora | 4 " | — mixta | 1 " |

| | Fr. C. |
|--|-------------|
| Myrsine undullata . . . | 1 » |
| Myrtus bullata . . . | 5 » |
| — tenuifolia . . . | 1 » |
| — tomentosa . . . | 2 » |
| — communis <i>âfl. double tige à cour.</i> . . | 2-50 |
| Nerium atropurpureum | |
| odoratissimum . . . | 1-50 |
| — nigrum . . . | 1-50 |
| — odoratissimum speciosum . . . | 2 » |
| — albo plena . . . | 1-50 |
| — cupreum . . . | 2 » |
| — carneum grandifl. . . | 1-50 |
| — elegans fol. aureis . . | 2 » |
| — grandiflorum pleno . . | 1-50 |
| — novum . . . | 1-50 |
| — Grangeanum . . . | 5 » |
| — Hævillii . . . | 1-50 |
| — indicum multiflor. . . | 1-50 |
| — <i>Jeanne d'Arc</i> . . . | 4 » |
| — lutescens . . . | 1-50 |
| — Lalieure . . . | 1-50 |
| — Mahierii . . . | 1-50 |
| — <i>M^{me} Lesieur</i> . . . | 1-50 |
| — odora viola . . . | 1 » |
| — punctatum pleno . . . | 1-50 |
| — purpurea pleno . . . | 1-50 |
| — Rixiodianum . . . | 2 » |
| — splendens . . . | 50 c. à 1 » |
| — maximum . . . | 2 » |
| — coccinea . . . | 2 » |
| — splendidissima . . . | 2 » |
| — undulpetalum . . . | 2 » |
| — venustum . . . | 2 » |
| Nierembergia intermed. . . | 1 » |
| Nintooa glauca . . . | 1 » |
| Olea speciosa . . . | 5 » |
| Orthrosanthus multifl. . . | 1-50 |
| Orontium japonic. fol. varieg. . . . | 5 » |
| Oxybolum arborescens . . | 1 » |
| — cordifolium . . . | 2 » |
| — ellipticum . . . | 2 » |
| — obovatum . . . | 2 » |
| — pultenoides . . . | 2 » |
| — retusum . . . | 5 » |
| Passiflora cœruleo racemosa . . . | 1 » |
| — difformis . . . | 2 » |
| — Lemischesiana . . . | 1 » |
| — Middletoni . . . | 1 » |
| — onychina . . . | 1 » |
| Pelargonium (v. plus loin aux spécialités.) | |
| Pentlandia miniata . . . | 1 » |
| Pernetia angustifolia . . | 2 » |
| — mucronata . . . | 1-50 |
| Petrophila anemonæfolia . | 4 » |
| — rigida . . . | 5 » |
| Petasostylis nigrescens (Lisianthus) . . . | 2 à 4 » |
| Petunia, 12 nouvelles variétés pour . . . | 6 » |

| | Fr. C. |
|---|---------|
| Peumus fragrans . . . | 2 » |
| Phlox Drum. alb. . . . | 1 » |
| — — 10 <i>nouv. var. pièce à.</i> . . . | 1 » |
| — — Leopoldii . . . | 1 » |
| Phormium tenax . . . | 1 » |
| Phyllopodium rigidum . . | 1 » |
| Physianthus albens . . . | 1-50 |
| — auricomus . . . | 2 » |
| — undullatus . . . | 1 » |
| Physolobium carinata . . | 1 » |
| — gracile . . . | 1 » |
| — Stirlingii . . . | 1 » |
| Pimelia decussata 50 c. à 1 » | |
| — longifolia . . . | 1 » |
| — rubra . . . | 1 » |
| — mirabilis . . . | 2 » |
| — Hendersonii . . . | 2 » |
| — lanata . . . | 1 » |
| — linifolia . . . | 1-50 |
| — ligustrina . . . | 1 » |
| — Neippergiana . . . | 5 » |
| — prostrata . . . | 2 » |
| — rosea . . . | 1-50 |
| — sps. nova de la nouvelle Zélande . . | 1 » |
| — spectabilis . . . | 1-50 |
| — Verschaffeltiana . . | 5 » |
| Pittosporum glomerat. . . | 1 » |
| — Maii . . . | 1 » |
| — tobira fol. argenteis . | 2 » |
| Plagiolobium Chori-zemifolia . . . | 15 » |
| Platylobium formosum . . | 5 » |
| — Murrayanum . . . | 5 » |
| — triangulare . . . | 50 » |
| Plumbago larpentæ . . . | 4 » |
| Podolobium heterophyll. . | 5 » |
| — staurophyllum . . . | 5 » |
| — trilobatum . . . | 5 » |
| Poinciana Gilliesii. . . | 1 » |
| — regia . . . | 5 » |
| Polygala bracteolata . . | 1 » |
| — cordifolia . . . | 1 » |
| — Dalmaisiana . . . | 1 » |
| — grandiflora . . . | 1 à 2 » |
| — Heisteri . . . | 1 » |
| — mixta . . . | 1 » |
| Polyspora axillaris. . . | 2 » |
| Prepusa Hookerii . . . | 20 » |
| Primula denticulata . . . | 1 » |
| — sinensis fimbr. rosea . | 2 » |
| — alba . . . | 2 » |
| — fl. albo pleno . . . | 2 à 6 » |
| — fl. rubro pleno . . . | 6 » |
| Pronaya elegans. . . . | 2 » |
| Prostanthera lasianth. . . | 1 » |
| — violacea . . . | 1 » |
| Protea argentea . . . | 2 » |
| — acaulis . . . | 2 » |
| — cynaroides . . . | 2 » |
| — speciosa . . . | 2 » |
| — nigra . . . | 2 » |
| — latifolia . . . | 6 » |

| | Fr. C. |
|---|----------|
| Pterostigma grandifl. . . | 1 » |
| Pultenea biloba. . . . | 1 à 5 » |
| — daphneoides . . . | 1 » |
| — candida . . . | 1 » |
| — flexilis . . . | 2 » |
| — mucronata . . . | 2 » |
| — stipularis . . . | 5 » |
| — stricta . . . | 50 » |
| — subumbellata . . . | 50 » |
| — thimifolia . . . | 2 » |
| — vestita . . . | 2 » |
| Punica nana avec tige et belle couronne. . . | 5 » |
| Quadrya heterophylla . . | 5 » |
| Quercus glabra . . . | 5 » |
| — petiolaris . . . | 5 » |
| — rugosa . . . | 2 » |
| Rhododendrum (Voir plus loin). | |
| Rhopala corcovadense. . . | 50 » |
| — Estrelense . . . | 50 » |
| — elegans . . . | 25 » |
| Rœlla ciliata. . . . | 1 » |
| Rodocheton volubile . . . | 50 » |
| Rosa beng. à cinq couleurs de la Chine. . . | 2 » |
| Rubus smilacifolius . . . | 1-50 |
| Salvia azurea. . . . | 1 » |
| — eryocalyx . . . | 75 » |
| — prunelloides . . . | 50 » |
| — patens alba . . . | 5 » |
| — speud. coccinea . . . | 1 » |
| Samolus littoralis . . . | 50 » |
| Sapium berberidifolium . . | 1 » |
| Sarracenia Drummondii . . | 5 » |
| — purpurea . . . | 5 » |
| Schottia dentata. . . . | 8 » |
| Schweigeria pauciflora . . | 1 » |
| Scutellaria splendens. . . | 1 » |
| — Ventenatti . . . | 1 » |
| Siphocampylus betulaefolius . . . | 1 » |
| — cordatus . . . | 1 » |
| — coccineus . . . | 1 » |
| — duplo serratus . . . | 1 » |
| — nitidus . . . | 1-50 » |
| — Parthoni . . . | 1 » |
| — spicatus . . . | 1 » |
| Sollya heterophylla. . . | 50 » |
| — linearis . . . | 1 » |
| Spherolobium vimin. . . | 1 » |
| Sprengelia incarnata . . . | 5 » |
| Stadmannia austr. 15 à 25 » | |
| — <i>fort</i> . . . | 75 » |
| — Fraserii . . . | 50 » |
| Statice arborea. . . . | 5 à 10 » |
| — Dickensonii . . . | 5 » |
| — Fortunei . . . | 4 » |
| — frutescens . . . | 5 » |
| — imbricata . . . | 5 » |
| — monopetala . . . | 1 » |
| — mucronata . . . | 1 » |
| — macrophylla . . . | 8 » |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|--|----------|---|----------|
| Statice purpurea | 2 » | Tetranthera Japonica | | Veronica salicifolia | 50 |
| — puberula | 1 » | (vera) | 5 à 50 » | — speciosa | 50 |
| — Reinwardti | 1-50 | — Sieboldi | 4 » | — rosea | 2 » |
| — sinuata | 1-50 | Thea assamica | 4 » | — nova Zelandia | 1 » |
| Stautonia latifolia | 2 » | — bohea | 2 » | Vesalea floribunda | 1 » |
| Stenanthera pinifolia 2 à 4 » | | — viridis | 2 » | — rupestris | 1 » |
| Stenochilus viscosus | 1 » | Thibaudia setigera | 10 » | Viburnum Awabuki | 1 » |
| Styldium fruticosum | 1 » | — Sprengelii | 10 » | — cylindricum | 10 » |
| — fasciculatum | 50 | — vaccini folia | 10 » | Villarsia chilensis | 2 » |
| — glaucum | 15 » | Thomasia canescens | 2 » | — parnassifolia | 5 » |
| — recurvum | 5 » | Thysanotus proliferus | 2 » | Wigella rosea | 1 » |
| Styphella tubiflora | 6 » | Torenia asiatica | 1 » | Witsenia corym- | |
| — viridiflora | 3 » | — concolor | 1 » | bosa | 2 à 5 » |
| Swainsonia alba | 50 | Tremandra Hugelii | 3 » | Xanthosia rotundifolia | 1 » |
| — purpurea | 50 | — verticillata | 2 » | Yucca draconis | 5 à 25 » |
| Tacsonia incarnata | 1 » | Tradescantia Zebrina | 50 | — très-fort | 150 » |
| — molissima | 1 » | Tristania laurina | 1 » | — flexilis | 8 » |
| — manicata | 1 » | Tropaeolum azureum 5 à 10 » | | — gloriosa | 1 à 5 » |
| Talauma pumila | 2 » | — brachyseras | 1 » | — filament . 1-50 à 5 » | |
| Tasmannia aromatica | 2 » | — crenatiflorum | 1 » | — longifolia | 15 » |
| — minor | 5 » | — lobbianum | 1 » | — recurvata | 10 » |
| Tecoma (Voir Bignonia) | | — Moritzianum | 50 | Zamia spiralis | 5 » |
| Telopea speciosissima | 20 » | — pentaphyllum | 1 » | Zauscheria californica | 5 » |
| Templetonia glauca | 1 » | — rhomboideum | 2 » | Zichya molle | 3 » |
| — retusa | 1 » | — tricolorum | 1 à 5 » | — pannosa | 4 » |
| Testudinaria elephan- | | Tussillago Japonica | 3 » | — tricolor | 4 » |
| tipes (Tamus) . 2 à 50 » | | Tweedia cœrulea | 1 » | Zieria laevigata | 2 » |
| Tetranema Mexicana | 50 | Verbena (Voir plus loin) | | | |

SPÉCIALITÉS.

CHOIX DE CAMELLIAS.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus; ceux de la colonne du milieu, à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force dans ce genre; ceux de la colonne de droite à des plantes de force à porter fleurs.

| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|--|-----|------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
| Acidalla | » | 1-50 | 5 | Alba Casoretti | 2 | 4 | » |
| Belle forme, rosette blanche. | | | | Imbriqué, blanc pur. | | | |
| Adélaïde | » | 1-50 | 4 | — Fenestrata | » | 1-50 | 3 |
| Superbe, rouge très-foncé | | | | Blanc superbe, imbriqué, | | | |
| imbrication parfaite, 1 ^{er} ord. | | | | 1 ^{er} ordre. | | | |
| Adonidea | » | 1-50 | 4 | — grandiflora | » | 1-50 | 3 |
| Pœoniforme, quelquefois | | | | — illustrata (Skirving's | | | |
| imbriqué, pétales lavés de | | | | Seedling) | 1 | 2 | » |
| rose, reflétées de couleur | | | | Imbriqué, blanc pur. | | | |
| paille, légèrement veinés de | | | | — Londoniensis | » | 1 | 3 |
| laque et régulièrement bordés | | | | Belle forme imbriquée, | | | |
| de blanc, 1 ^{er} ordre. | | | | blanc pur. | | | |
| Adrien Lebrun (Graulthieri) | » | 1 | 3 | — laccina | » | 3 | » |
| Belle forme, cerise vif, pé- | | | | — novissima | » | 3 | » |
| tales du centre striés ou pa- | | | | — lucina | » | 2 | » |
| llaché de blanc pur. | | | | Belle fleur imbriquée, d'un | | | |
| Agnesi | » | 1-50 | 3 | blanc pur, ornée de quelques | | | |
| Imbriqué, rose. | | | | rare striés carminées. | | | |



| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|---|------|------|------|--|------|------|-----|
| Alba Imbricata, Low . . . | 10 | " | " | diamètre, extra pleine, forme du <i>Triumphans de Gand</i> , blanc de crème, très-délicat, changeant vers la fin de la floraison en une couleur de chair très-légère, sur choix. | | | |
| Des plus beaux blancs, bien imbriqués et peut compter parmi les perfections du genre. (<i>Voir Iconographie des Camellias par A. V. G.</i>) | | | | | | | |
| — Florentina . . . | " | 4 | " | Baronne d'Udekem . . . | 1-50 | 4 | " |
| — rosea virginalls . . . | " | 3 | " | Forme imbriquée, extra saumon bronzé, ligne blanche métallique au centre de chaque pétale, 1 ^{er} ordre. | | | |
| — novissima . . . | 1 | 3 | " | Baronne Claul . . . | 10 | " | " |
| — plena . . . | " | 1 | 2 | Bazzoni d'Italie . . . | " | 1-50 | 4 |
| — Lombardii . . . | 10 | " | " | Pæoniforme, corail brill. | " | 1-50 | 3 |
| Aleina . . . | " | 2 | 5 | Barringtonia rosea . . . | | | |
| Alexandro II grande . . . | " | 2 | " | Rose superbe. | | | |
| Alexiana, Low . . . | " | 5 | " | Beall rosea, Low . . . | 3 | 6 | " |
| Dans le genre du C. Duchesse d'Orléans. | | | | Rose imbriquée, très-joli. | " | 1 | 5 |
| Althæflora . . . | " | " | 1-50 | Bellina major . . . | | | |
| Amabilis, Smith . . . | " | 1 | 3 | Très-grand, semi imbriqué, saumon strié de blanc au centre, très-beau. | | | |
| Très-beau, laque, quelquefois rose foncé, imbrication délicate, 1 ^{er} ordre. | | | | Belot Defougères . . . | 2 | 4 | " |
| Amœna novissima . . . | 2 | 4 | " | Benneyll . . . | 3 | 8 | " |
| Amœnissima . . . | 2 | 4 | " | Imbriqué, cramoisi, centre blanchâtre, finement strié de blanc, magnifique. | | | |
| Americana, Dunlap . . . | " | 2 | 5 | Bergamo . . . | 1 | 3 | " |
| Forme du C. Duchesse d'Orléans, rose tendre strié ou tacheté de carmin. | | | | Bell Erminia . . . | " | 2 | " |
| Anemoneflora alba (White Warratah) . . . | " | " | 1-50 | — Sophie . . . | 2 | " | " |
| Blanc plein, joli. | | | | Birro . . . | " | 1 | " |
| Annibal . . . | " | 1-50 | 3 | Laque carminé, très-foncée, imbr. superbe. | | | |
| Beau rouge. | | | | Billott . . . | " | 2 | " |
| Apollo . . . | " | 1-50 | " | Forme de l'alba pleno. | | | |
| Archinto . . . | " | 1-50 | 4 | Besana . . . | 6 | " | " |
| Imbriqué, cramoisi nuancé, très-beau. | | | | Bolongara . . . | " | 2 | " |
| Ardens d'Italie . . . | " | 1-50 | 4 | Grand Camellia des îles Borromées. | | | |
| Arloste d'Italie . . . | 1 | 1-50 | " | Bouardii . . . | 1-50 | 5 | " |
| Augustina superba . . . | 1-50 | 3 | 6 | Bostoniana . . . | 5 | " | " |
| Augustiniana . . . | 1 | 2 | " | Cérise, superbe transparent, pendant du <i>Marchioness of Exeter</i> . | | | |
| Très-beau. | | | | Brochii . . . | 3 | 6 | " |
| Aulica, Loddiges et Sons . . . | 4 | 8 | " | Très bien imbriquée, rouge cerise, une ligne blanche du limbe à l'onglet, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Très-beau, pétales blancs, couverts de veinules roses, sauf le pourtour de sa fleur qui est d'un blanc pur. | | | | Bradamante . . . | 2 | " | " |
| Aurora . . . | 1 | 2 | " | Brotzi . . . | 2 | " | " |
| Rose saumoné, belle fleur souvent marbrée de blanc. | | | | Borgia . . . | 2 | 4 | " |
| Aurora, Casoretti . . . | 2 | 4 | " | Brillante Casoretti . . . | " | 3 | " |
| Ayez . . . | 2 | 5 | " | Superbe blanc, bien imbriqué. (<i>Voir iconographie des Camellia.</i>) | | | |
| Alida . . . | 2 | 4 | " | Brownii . . . | " | " | 2 |
| Allunea rosea . . . | " | 2 | 3 | Très-grande, Pæoniforme, rouge saumoné. | | | |
| Très-beau, rose tendre. | | | | Bruceana . . . | " | 1 | 2 |
| Armenia . . . | " | 3 | " | Fleur tr.-grande, superbe, rouge très-foncé. | | | |
| Baltimoreana . . . | 2 | 4 | " | Burchell . . . | " | 1 | 5 |
| Très-grand, délicat, blanc, strié de rose. | | | | Calvi . . . | " | 1-50 | " |
| Barni . . . | 1 | 2 | " | Calypso . . . | " | 1 | 5 |
| Ponceau, imbriqué, une bandelette blanche au centre de chaque pétale, 1 ^{er} ordre extra. | | | | Beau blanc, très-double. | | | |
| Baron Sigism. de Pronay . . . | 2 | 5 | " | | | | |
| Fleur de 5 à 6 pouces de | | | | | | | |

| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|---------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|
| Camellia de la Reine | 2 | 6 | 10 | Claritas | " | 1 | 2 |
| Imbr. très-grand, pétales | | | | Blanc, centre paille, élég. | | | |
| larges ronds, fond blanc, lé- | | | | Cliveana | " | 1 | 2-50 |
| gèrement accidenté de laque. | | | | Très-grand, rose. | | | |
| Camille Brozzoni | 15 | " | " | Clowestiana | " | 1-50 | 4 |
| Campo Molendini, Berlese. | 1-50 | 5 | 8 | Extra grand, blanc rosé, | | | |
| Imbriqué, cramoisi, strié | | | | couvert d'une poussière rose | | | |
| de blanc, très-beau. | | | | superbe, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Candidissima | " | 1 | 2-50 | Clothilde | " | 2 | 4 |
| Candor, Rev. Herbert. | 2 | 4 | " | Cœlestina | " | 2-50 | 4 |
| Blanc extra, imbriqué. | | | | Forme du double blanc, | | | |
| Cantoniana | " | 1-50 | 5 | extrêmement beau. couleur | | | |
| Large fleur, ponceau foncé. | | | | rose tendre, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Canova | 2 | 6 | " | Colletti | " | 1-50 | 4 |
| Campanulata | " | 1-50 | 5 | Sang velouté, couvert de | | | |
| Très-beau, rouge pourpre. | | | | larges taches de blanc, le | | | |
| Carminea, Broucki | " | " | 1-50 | plus pur, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Carolina | " | 1 | 5 | Colombo | " | 1-50 | 5 |
| Rose délicat. | | | | Grande fleur rouge, fort | | | |
| Caroline Smith d'Amérique. | 2 | 6 | " | belle, forme demi-imbriqué, | | | |
| Supérieurement imbriqué, | | | | pompon central très-compl. | | | |
| très-grand, rose délicat. | | | | Colvillii | " | " | 2 |
| Carswelliana | " | 1 | 2 | Grand, Pœoniforme, fond | | | |
| Brillante fleur d'un rose | | | | rose, strié et moucheté carm. | | | |
| légèrement saumoné, forme | | | | — <i>rubra</i> | " | " | 2 |
| du double blanc, une strie | | | | — <i>striata</i> | " | 1-25 | 5 |
| blanche du centre à la cir- | | | | Très-beau. | | | |
| conférence de chaque pétale. | | | | Commensa, Jacob Mackoy . | 2 | 4 | " |
| — <i>alba</i> | " | 2 | " | Composita | " | 1-50 | 4 |
| Fleur moyenne, pétales | | | | Bien imbriqué, rose vif, | | | |
| ronds, imbriqués jusqu'au | | | | très-délicat. | | | |
| centre, fond blanc, strié de | | | | Comte de Flandre | " | 2 | " |
| carmin, feuilles rondes, très- | | | | — <i>de Paris, Van Geers-</i> | | | |
| distingué. | | | | <i>daele</i> | 1 | 5 | 8 |
| Castiglioni | 1 | 2 | " | Issu de la <i>duchesse d'Or-</i> | | | |
| Blanc très-plein, cœur | | | | <i>léans</i> , admirable variété, | | | |
| jaune, légèrement striée de | | | | fixée par la greffe, fond car- | | | |
| vert, superbe. | | | | min, strié et flagellé de cra- | | | |
| Catherine Longhi | 2 | 5 | " | moisie, imbrication modèle. | | | |
| Forme parfaite, grand de | | | | Cockii | " | 1-25 | 5 |
| 12 centimèt. et plus, carmin | | | | Croimoisi foncé satiné, | | | |
| foncé. | | | | souvent strié de blanc. | | | |
| Carlotta Grizi | 2 | 4 | " | Comte Caraccioli | " | 1 | 5 |
| Centifolia, Low. | 6 | 15 | " | — <i>Fossi</i> | 4 | " | " |
| Rouge cramoisi, accidenté | | | | Comtesse Antoin. Castel | | | |
| de blanc, imbriqué, très- | | | | <i>Barco</i> | 5 | " | " |
| grand, fleurs un peu pen- | | | | — <i>Hartwig</i> | " | 1 | 5 |
| chées, feuilles verrugueuses | | | | Beau rouge, imbriqué. | | | |
| et réticulées, fleurit très- | | | | — <i>Rambaldo</i> | " | 1 | 5 |
| abondamment. | | | | Magnifique. | | | |
| Castellum Antwerpiense, | | | | — <i>Samailoff</i> | 1-50 | 4 | " |
| <i>Moens</i> | 1 | 2 | " | Confissa | 2 | 4 | " |
| Cerere | 2 | " | " | Concinnia | " | " | 2 |
| Cerito d'Italie | 1 | 2 | " | Joli, imbriq., rouge foncé. | | | |
| Forme imbriquée, blanc à | | | | Conspicua, Loddiges | " | 1-25 | 5 |
| striés roses, de surchoix. | | | | Grande fleur, ponceau, | | | |
| Cesar Augusto | 2 | 5 | " | strié de blanc. | | | |
| — <i>Aricii</i> | 2 | 5 | " | Constantin | 1-50 | 5 | " |
| Chandleri | " | " | 2-50 | Rouge saumoné. | | | |
| — <i>elegans</i> | " | " | 2-50 | Cooperi | " | 1 | 2-50 |
| Rose délicat, forme très- | | | | Rouge saumoné, imbri- | | | |
| belle, étalée. | | | | qué, superbe. | | | |
| Charles-Quint | 2 | 5 | " | Coquettii | " | 2 | 6 |
| Charlotte Corday | 4 | 8 | " | Forme d'une belle rose cent- | | | |

| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|---|-----|------|------|--|------|------|------|
| feuill., rose saumon, parsemé de taches blanches, 1 ^{er} ordre. | | | | Duc de Reichstadt | 2 | 4 | " |
| Corallina | " | " | 2 | Duchesse d'Orléans, (Reine des Camélias) | " | 1-50 | 5 |
| Sang foncé. | | | | Magnifique fleur, forme de l'Alba pleno, blanc, lavé de rouge au sommet des pétales, strié et ponctué de rouge et de rose, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Coronata | " | " | 2-50 | — de Savoie | 5 | 6 | " |
| Beau rose. | | | | — de Nothumberland, Lee et C^e | 5 | 10 | " |
| Cradocki | " | 2 | " | Très-beau, dans le genre du C. <i>Duchesse d'Orléans</i> . | | | |
| Cruciata | " | 1-50 | 4 | — de Nemours | " | 1-50 | 4 |
| Curvatifolia | " | " | 5 | Duguetii odorata | 2 | 6 | " |
| Blanc, très-double, imbriqué. | | | | Dobrei | 1-50 | 5 | " |
| Comte de Canino | 4 | " | " | Coquelicot brillant, le plus belle <i>Anemone</i> connue, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Darkimbricata, Low | " | 1-50 | 4 | Eburnea | " | 1-50 | 4 |
| Darsi | " | 2 | 4 | Eclipse, Press | " | " | 2 |
| Rouge violacé, largement tacheté de blanc, très-remarquable, 1 ^{er} ordre. | | | | — Preston | " | " | 2-50 |
| Dahleii | " | " | 5 | Elena Ugouli | 5 | 10 | 20 |
| Rouge, forme imbriqué. | | | | Imbriqué, très-plein, bl. ligné ou tacheté de rose ou de carmin. | | | |
| Dahliiflora ignea | " | " | 5 | Elphinstoni, (flammeola superba) | " | " | 2 |
| Rouge vif, imbriqué. | | | | Rouge foncé, souvent unicolore et médiocre, parfois bien panaché. | | | |
| Daviesii, Davies et C^e | 5 | 6 | " | Emmellana | 1 | 1-50 | 4 |
| Rose rouge, très-beau. | | | | Charmante variété, fixé par la greffe, rose satiné, Pæoniiforme, extra double. | | | |
| Davio | 1 | 2 | " | Emilia Gavazzi, d'Italie | 1 | 5 | 10 |
| Decora | " | 1 | 5 | Blanc rayé de rouge vif, forme parfaite. | | | |
| Très-grand, beau rouge. | | | | — grandiflora | " | 1-25 | 5 |
| Decus Italicum | 1 | 1-50 | " | Fort beau et très grand, fasciculé, ponceau veiné. | | | |
| Forme imbriquée, magnifiquement fleur blanc, 1 ^{er} ordre. | | | | — Taverna | 1 | 2 | 6 |
| Delicatissima | " | " | 2-50 | Forme d'une Renoncule, pétales extérieurs carmin vif, ligné de blanc, pétales du centre blanc, panachés de carmin, superbe. | | | |
| Denotaris | 2 | 4 | " | Emilio Campioni | 50 | " | " |
| Derbyana (Amanda) | " | " | 2-50 | Beau rose strié de blanc, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Diademiflora | " | 1-50 | 5 | — Bandiera | 4 | 12 | " |
| Parfait, carmin, strié de blanc. | | | | Emperor, Davies et C^e | 2 | " | " |
| Diamantina | " | 1-50 | 4 | Provient du C. <i>Colvilli</i> avec le C. <i>reticulata</i> . Ses fleurs bien pleines tiennent de la forme et du coloris de ce dernier. Il a remporté le prix de la Société d'Horticulture de Londres. | | | |
| Rose, 1 ^{er} ordre. | | | | Elata, Cunningham | " | " | 2-50 |
| Diva Maria | " | 1-50 | 4 | Bien imbriqué, rose maculé de blanc. | | | |
| Imbriqué, plein, rose. | | | | Eleonora | " | 5 | 6 |
| Diana nova | 5 | 6 | " | Superbe rosace, très-bien | | | |
| Donkelaari | " | 1 | 2-50 | | | | |
| Dorsetti | " | " | 2 | | | | |
| Douglasii | " | 1-50 | 5 | | | | |
| Rose vif velouté, entièrement veiné, très-double. | | | | | | | |
| Drouard-Gouillon | " | 1-50 | 5 | | | | |
| Blanc, Pæoniiforme, large fleur. | | | | | | | |
| Duc de Bretagne | 2 | 6 | " | | | | |
| Fleur épaisse, supérieurement imbriquée, d'un très-beau rose vif, strié et maculé de blanc. | | | | | | | |
| — de Chartres | 5 | 6 | " | | | | |
| — d'Orléans, Tamponet | " | 1 | 5 | | | | |
| Rouge. | | | | | | | |
| — de Litta | " | 5 | " | | | | |
| Imbriqué, très-plein, beau rouge, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. | | | | | | | |
| — de Brabant, Moens | " | 5 | 6 | | | | |
| Imbriqué, blanc fouetté de rose de diverses nuances, très-beau. | | | | | | | |

| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|---|------|------|------|--|------|------|-----|
| imbriqué, rouge brique à reflets pourpres, pétales reg. marqué d'une ligne bl. | | | | Frederico Confalonieri | 10 | " | " |
| Esperia | " | 1-50 | 4 | Garviel | " | 1-25 | 5 |
| Estheri | 1-50 | 5 | " | En globe, aurore flammé de carmin. | | | |
| Globuleux, tr.-grand, plus de cinq pouces; plein, carné tendre, moucheté de rose. | | | | Galathea d'Italie | " | 1 | 4 |
| Etrusea | 4 | " | " | Général Washington, Boll. | 2 | 4 | " |
| Eximea | " | " | 2-50 | Bien imbriqué, blanc refleté de paille, à tâches ou à striés roses; ses fleurs sont quelquefois moitié roses et moitié blanches. | | | |
| Très-beau rouge, bien imb., fleurit tardivement. | | | | — Lafayette | 8 | " | " |
| Exquisita, Low | 4 | 15 | " | — Zunilis nova | 2 | 4 | " |
| Petites fleurs rouge clair, bien doubles, en forme de renoncule. | | | | Genevensis | " | 5 | " |
| Fanny Essler | " | 1-50 | 4 | Gearo | 1-50 | 5 | " |
| Faustine | 5 | " | " | Gitana d'Italie | 1-50 | 5 | " |
| Fastuosa d'Italie | " | 2 | " | Gielsi, (Dark coccinea) | " | " | 2 |
| Double, à trois faisceaux, carné blanc extra. | | | | Rouge foncé, panachées de larges tâches blanches. | | | |
| Fecho | 5 | 6 | " | Globe crimson | 2 | 6 | " |
| Fairleyi | " | " | 3 | Gloriadel Verbano, Rovelli frères | 4 | 10 | " |
| Belle forme, rouge laque clair, souvent maculé de bl. | | | | Imbriqué, rouge vif et ligné de blanc. | | | |
| Fimbriata | " | " | 2 | — d'Italia | 2 | 4 | " |
| Fire ball | 10 | " | " | Goffredi nova | 5 | 6 | " |
| Flavescens nova | 5 | " | " | Gozzi d'Italie | 2 | 5 | " |
| Florentina superba | " | 2 | " | Beau rose vif, marginé de rose tendre extra. | | | |
| Sang, entièrement fouetté de blanc. | | | | Gobernativa | 1-50 | 5 | " |
| Florida | " | " | 2-50 | Très-double, très-grand, imbriqué, carmin foncé, très-beau. | | | |
| Très-double rose. | | | | Grande Duch. d'Etruria | 1 | 4 | " |
| Floyi, (Grand-Frédéric) | " | 1-50 | 5 | Pæoniforme, fond blanc, strié de rose, très-beau. | | | |
| Rose très-vif, pétales très-larges, bien ronds, forme imbriquée, très-beau. | | | | Grand Calderara | " | 1-50 | " |
| Forbesi, Low | " | 1-50 | 5 | Rose, très-large. | | | |
| Imbriquée, cerise vif. | | | | Grand Napoléon, Marchese Ridolfi | 5 | 8 | " |
| Fordi | " | 1 | 5 | Immense fleur rouge, à grandes macules blanches, extra. | | | |
| Moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales arrondis très-nombreux. | | | | Grossi | 1 | 2 | " |
| Formosa, (Angulans) | " | 1 | 5 | Cramoisi, très-beau. | | | |
| Ponceau, parfois finement strié de blanc, très-beau. | | | | Grunelli | " | " | 2 |
| Fornarina | 2 | 6 | " | Blanc très-pur, superbe forme. | | | |
| Imbriqué, très-plein, blanc, ligné de carmin ou de rose. | | | | Guthriana, Low | 2 | 4 | 10 |
| Fortuita | " | 1-50 | 5 | Cramoisi foncé, magnifi-que. | | | |
| Un des plus beaux blanc, coloris très-pur. | | | | Guttata, (Sabiniana) | " | 1-25 | 5 |
| Francofurtensis | " | " | 5 | Blanc ponctué de rouge. | | | |
| Imbr. rouge foncé, passant au rose très-foncé. | | | | Grandis, Low | 20 | " | " |
| Franklin | 5 | 8 | " | Imbriqué, beau rouge, quelques pétales striés de blanc. (Voir iconographie des Camellias par A. V. G.) | | | |
| Frosti | 5 | 8 | " | Halleyi | 5 | 10 | " |
| Fostergli | 2 | 4 | " | Rouge pourpre imbriqué. | | | |
| Futting, (speciosa) | " | " | 2 | Hamiltoniana | 2 | 4 | " |
| Pæoniforme, beau rouge. | | | | Hampsteadii d'Amérique | 2 | 6 | " |
| Felouté | " | 2 | " | Bien imbriqué, rose mag- nique. | | | |
| Frederic alba | 1-50 | 5 | " | | | | |
| Un des plus beaux blancs. | | | | | | | |



| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|--|------|------|------|---|------|------|------|
| Hannah Moore | 1 | 2 | " | Jarba | " | 2 | 5 |
| Cramoisi foncé à larges taches blanches. | | | | Jeffersonii | 2 | 4 | 15 |
| Haylockii | " | " | 2-50 | Rouge très-brillant, im- | | | |
| Pæoniforme, du plus beau blanc, à rares striés, rose tendre. | | | | briquée, magnifique. | | | |
| Helena Montii | 2 | 4 | " | Jenny | 2 | 4 | " |
| Hendersoni , (<i>Lombardi</i>) | " | 1-50 | 5 | Jubilée, Low | 6 | 15 | " |
| Rose, très-belle forme imbriquée. | | | | Bien imbriqué, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose, beau, centre jaune clair. | | | |
| Henri Favre | " | 1-25 | 5 | Juliana | " | 1-50 | 5 |
| Rose saumoné, fleur imbriquée, fort belle. | | | | Très-belle forme, blanc strié et moucheté de rose. | | | |
| Heteropetala alba , (<i>British-Queen, Young</i>). | " | 1 | 2-50 | Jamma | " | 1-50 | 5 |
| Beau Camellia blanc, plein, à délicates striés roses. | | | | Jardin d'hiver | 5 | " | " |
| — rubra | " | 1 | 5 | Jussieu | " | " | 2-50 |
| Semi imbriqué, semi Pæoniforme, très-beau. | | | | King , (<i>spectabilis maculata</i>) | " | " | 2-50 |
| Hookerii, Low | " | " | 2-50 | — rosea | " | 1-50 | 5 |
| Horsfallii | " | 2 | " | Kewblush | " | " | 2 |
| Rouge foncé, très-fortement veiné, centre finement strié de blanc. | | | | Lactea elegans | " | 1-50 | 5 |
| Hosackii | " | 1 | 1-50 | Beau blanc, gracieuse forme. | | | |
| Rouge foncé, sirii de bl. | | | | Lady Elencor Camphell | " | 1-50 | 5 |
| Hurga | 1 | 5 | " | Rouge foncé, quelquefois maculé de blanc. | | | |
| Blanc, bien imbriqué. | | | | Lady Grafton | " | 1-50 | 5 |
| Houdii | " | 1-25 | 5 | Très-grand, élégamment fasciculé, rouge, légèrement saumoné, fortement veiné. | | | |
| Il Roberti | 2 | 6 | 10 | — Hill | " | 2 | 4 |
| C'est un beau Camellia bien bicolore, c'est-à-dire que chaque pétale est moitié rouge cerise et moitié blanc, à teintes vives, mais bien fondues; pétales grands, imbrication régulière à centre rouge. (<i>Voir iconographie des Camellia par A. V. G.</i>) | | | | — Robert Peel | 1 | 2 | 4 |
| Illustris | 5 | " | " | Landrethii | " | 1-50 | 5 |
| Imbricata | " | " | 2-50 | Forme et dimension de l' <i>Imbricata</i> , d'un rose blanchissant vers le centre, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Forme du <i>double blanc</i> , rouge carminé, parfois bien panaché. | | | | Lainatensis | 2 | 4 | " |
| — alba , (<i>Triumph. alba</i>). | " | " | 2-50 | Lecchiana nova | 2 | 4 | " |
| Forme imbriqué, blanc de lait très-délicat, striés roses, quelquefois l'inverse; alors fond rose tendre à striés blanches, charmant. | | | | Beau rouge, très-double. | | | |
| Imbricata magna | 4 | 8 | " | Latifolia macrantha | " | 1-25 | 5 |
| — spiraliter | 1-50 | 6 | " | Lawrenceana d'Amérique | 1 | 1-50 | 5 |
| Incomparabilis | " | " | 5 | Plus double que le <i>Chandlerii</i> et mieux panaché. | | | |
| Innocenza | " | 1-50 | 4 | Laurenceana d'Italie | " | 1-50 | 4 |
| Blanc très-pur, forme très-gracieuse, superbe. | | | | Fleurs, feuilles et branches en miniatures. | | | |
| Insubria | " | 2 | 5 | Leda | 1 | 4 | 10 |
| Très-double, moyen, forme imbriquée, rose strié de blanc, 1 ^{er} ordre. | | | | Imbriqué, beau blanc strié de rouge, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Incarnata | " | " | 2 | Lecana superba , (<i>Beali des Anglais</i>). | " | 1 | 2-50 |
| Il signa | 2 | 2 | " | Imbriqué, rouge orange, fleur modèle. | | | |
| Beau blanc, 1 ^{er} ordre. | | | | Lefebvriana | " | " | 2-50 |
| | | | | Pleine régul., cerise clair. | | | |
| | | | | Leonardi d'Italie | " | 1-50 | " |
| | | | | Rose saumoné superbe, belle forme. | | | |
| | | | | Leonore | 1-50 | 5 | " |
| | | | | Leopold 1^{er} | 2 | 4 | " |
| | | | | Rouge velouté, forme du <i>Triumphans</i> . | | | |
| | | | | Leopoldina d'Italie | 2 | 4 | " |
| | | | | Grande et belle fleur bl., | | | |

| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|--|-----|------|------|---|------|------|------|
| pointué de rose et strié de rouge. | | | | Merope | | 1-50 | " |
| Lepida | " | " | 2-50 | Metronesson | 3 | 6 | " |
| Lineata superba | " | 1-50 | 3 | Micans | " | 1-50 | 4 |
| Lingil | 3 | 6 | " | Rose carminé, bien imbr., | | | |
| Longoni | 3 | 6 | " | 1 ^{er} ordre. | | | |
| Lowil | " | 4 | 8 | Mile-End. | " | " | 5 |
| Imbrication très-régulière, carmin foncé. | | | | Joli Camellia, rouge de fleur de grenadier, ligules très-nombreuses au centre. | " | | |
| La grande Sulfane | 2 | 6 | " | Miniata striata | " | 1-50 | 5 |
| La signora de Monza | 2 | 6 | " | Rose satiné délicat, une bandelette blanche, sépare chaque pétale en deux parties égales. | | | |
| Madame Harrison | 2 | 6 | " | Minuta | " | " | 2-50 |
| Fleur blanche, énorme. | | | | Rose, forme très-agréable, quelquefois admirablement panachées. | | | |
| Magdalena | 3 | 6 | " | Mira d'Italie | " | 1-50 | 5 |
| Maddalena Lechl. | 3 | 6 | " | Miss Baba | 4 | " | " |
| Madonna | 3 | 6 | " | Mistriss Ubaldi | 2 | 5 | " |
| Imbriqué, très-grand, bl. pur, centre carminée, très-beau. | | | | Blanc, très-plein, pétales larges, superbe. | | | |
| Maeleni | " | 1-50 | 1-50 | — Gunnell | 4 | 10 | " |
| Rouge sombre, pétales du centre très-nombreux. | | | | Beau blanc. | | | |
| Magnifica | " | " | 2-50 | Monstrosa fulgens | 3 | 6 | " |
| Superbe, blanc, double imbriqué. | | | | — Low | " | 1-25 | 5 |
| — rosea , (<i>Tancrède</i>) | " | 1-50 | 3 | Saumon lavé de rose, Pæoniforme, très-beau. | | | |
| Makoyi , (<i>Low</i>) | " | 1-50 | 3 | Monarch, Halley | " | 2 | 4 |
| Rouge, de belle forme. | | | | Mont-Blanc, Boddaert | 1-50 | 4 | 10 |
| Maometto | 3 | " | " | Forme superbe, majest., globuleuse, extra double, d'un beau blanc, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Marchioness of Exeter | " | 2 | 6 | Montii nova | " | 4 | " |
| Extra grand, rose tendre, forme imbriqué magnifique, 1 ^{er} prix, au dernier grand concours quinquenal de Gand. | | | | Pæoniforme, blanc pur, flammé de carmin, très-distingué. | | | |
| Marchisa Elisa Centurioni | 3 | " | " | Montironi | 1 | 3 | 8 |
| Marquise Demari | 3 | 6 | " | Très-beau blanc. | | | |
| Marguerite Gouillon | " | 2 | 6 | Milleri | " | 1-50 | " |
| Imbriqué et Pæoniforme, rose tendre, pointué et strié de rouge vif. | | | | Mrs. abby Wilder | 20 | " | " |
| Maria Dorothea | " | 1-25 | 3 | Murrayana vera | " | 1-50 | 5 |
| Blanc. | | | | Saumon rose nuancé, très-grand. | | | |
| Maria Elisa, Buist | 3 | 6 | " | Mutabilis | " | " | 3 |
| Rouge et blanc, irrégulier. | | | | Grande fleur, rose panaché comme le <i>Donkelaari</i> , quelques fois unicolore. | | | |
| Maria Luigia di Parma | " | 2 | " | Mutabilis Traversii | " | " | 5 |
| Très-grand, pétales étalées, rouge sang foncé à larges taches, blanc pur, est souvent unicolore. | | | | Rose saumon, bronzé, une ligné séparé en deux parties chaque pétale, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Maria Padilla | " | 4 | " | Myrtifolia | " | " | 2 |
| Imbriqué, rouge vif, sup. | | | | Imbriqué, rose. | | | |
| Marie-Thérèse | 3 | 10 | " | — alba , (<i>Albicans</i>). | " | 1-50 | 3 |
| Forme d'un Renoncule, blanc, carné vif, saupoudré de carmin tendre. (<i>Voir iconographie des Camellia.</i>) | | | | Superbe blanc, forme parfaite. | | | |
| Martheri | " | " | 2-50 | Medora | 2 | 4 | " |
| Blanc double, Pæoniforme, à plusieurs cœurs, très-beau. | | | | Melinda | 2 | 4 | " |
| Mazucheili | 2 | 8 | " | Napoléon le Grand, d'Italie. | 5 | 8 | " |
| Imbriqué, très-grand, cendré, 1 ^{er} ordre. | | | | Très-grand, rouge clair, grandes macules blanches, d'un grand effet. | | | |
| Mellinetti | " | " | 3 | | | | |
| Belle forme, cerise rose, bordé et strié de blanc pur. | | | | | | | |

| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|--|-----|------|------|--|-----|------|-----|
| Napoléon, Defresne | " | 1-50 | 4 | Papilionacea | " | " | 5 |
| Carmin vif, strié, pétales | | | | Ponceau, extra large, très- | | | |
| imbriqués à la circonférence, | | | | beau. | | | |
| Pæoniforme au centre, sup. | | | | Paride | " | 2 | " |
| Nassiniana | " | 1-50 | 4 | Rose saumoné, tacheté | | | |
| Rose superbe, imbriqué, | | | | comme le <i>Donkelaari</i> . | | | |
| veiné et satiné, parsemés de | | | | Parini, Casoretti | " | 2 | 5 |
| petites taches blanches. | | | | — <i>Mariani</i> | " | 2 | 5 |
| Negri | " | 1-50 | 5 | Parmentieri, Smith | " | 2 | 4 |
| Double, bien fait, blanc, | | | | Imbriqué, rose foncé, ex- | | | |
| lavé de rose. | | | | trémité des pétales transpa- | | | |
| Neoborascensis | " | 1-50 | 6 | rentes, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Tres-grand, très-beau, | | | | Peintres (des) | " | 1-50 | 3 |
| écarlate foncé, strié de blanc | | | | Superbe. | | | |
| au centre. | | | | Pendulia | " | 1-25 | 3 |
| Nettuno | " | 2 | " | Rose bien imbr. fort beau. | | | |
| Nitida, Chandler et Sons. | " | 2 | 6 | Penelope | " | 5 | " |
| Très-florifère, imbrication | | | | Parfaite, rouge violacé. | | | |
| parfaite, pétales, très-épais, | | | | Percivalli, Hibbert's | 1 | 3 | " |
| veinés et accidentés de blanc. | | | | Peregrina | " | 1-50 | 5 |
| Nivalis | " | 1-25 | 3 | Blanc, tuyauté, strié de | | | |
| Noblissima | " | " | 2-50 | carmin comme un œillet, | | | |
| Tr.-beau, blanc pur, belle | | | | fort distingué. | | | |
| forme. | | | | Peregalli | 5 | " | " |
| Norma | " | 3 | " | Paxtoni | " | 3 | " |
| Niohe | " | 1-50 | 4 | Pensylvanica | 4 | 10 | " |
| Rose très-double, quelque | | | | Rose sup., ombré, forme | | | |
| fois cerise clair. | | | | imbriqué. | | | |
| Ocroleuca | " | 1-25 | 3 | Perfecta Chalmer, (Chal- | | | |
| Double blanc, onglet paille, | | | | <i>mer's perfecta</i>) | 2 | 5 | " |
| très-belle forme, 1 ^{er} ordre. | | | | Imbrication parfaite, d'un | | | |
| Odorata novissima | " | 2 | " | rose tantôt foncé, tantôt très | | | |
| Orfeo | " | 2 | " | tendre, ses pétales très-min- | | | |
| Imbriqué, rouge foncé, | | | | ces, bien ronds, se recou- | | | |
| très-beau. | | | | vrent gracieusement et sont | | | |
| — <i>nova</i> | 4 | " | " | généralement tachetés de bl. | | | |
| Orlando | " | 1-50 | " | Pendant la seconde période | | | |
| Imbriqué, rouge éclatant, | | | | de sa floraison, ces fleurs | | | |
| très-beau. | | | | deviennent blanches. D'au- | | | |
| Oblongo decurrens | 8 | " | " | tre fois les pétales du centre | | | |
| Onor di Bibiana | 8 | " | " | reparviennent tout-à-fait | | | |
| Ottoiana | " | 2-50 | " | blanc, tandis que ceux de la | | | |
| Très-grand, superbe touffe | | | | circonférence conservent le | | | |
| au centre cerise, ponceau. | | | | vif coloris de la cerise. | | | |
| Oudiniana | 5 | 6 | " | Perpent d'Italie | 1 | 3 | " |
| Forme d'imbricata rubra, | | | | Rose, bien imbriqué, pa- | | | |
| rouge cerise foncé. | | | | naché de blanc. | | | |
| Pæoniflora | " | " | 1-50 | Peruchinii | 2 | 4 | " |
| Paladina | 2 | 5 | " | Personata | 1 | 3 | " |
| Palatinus Hungaricus, | | | | Philadelphica | " | 1 | 3 |
| <i>Baumann</i> | " | 1 | 3 | Très-grand, d'un beau | | | |
| Rouge. | | | | rose foncé. | | | |
| Palagii | 5 | 6 | " | Picta | 2 | 4 | " |
| Blanc rosé, maculé et ligné | | | | Pictorum coccineum | " | 1-50 | 5 |
| de rose et de pourpre. | | | | Rose satiné, taches blan- | | | |
| Palmer | " | 2-50 | 4 | ches, large fleur. | | | |
| Imbriqué, carmin, 1 ^{er} or- | | | | Pictorum rosea | " | 1-50 | 5 |
| dre, très-recherché. | | | | Grande fleur bien imbri- | | | |
| Palmer's Beali | " | 1-25 | 5 | quée, rose vif, superbe. | | | |
| Sup. rouge, carmin vif, li- | | | | picturata | " | 1-25 | 5 |
| gnées de blanc, bien imbriqué. | | | | Pæonif., fond bl., délicate- | | | |
| — Cavendishii, (perfec- | " | 1-25 | 5 | ment moucheté de carmin. | | | |
| <i>tion</i>) | | | | Pinetti | 1 | 1-50 | 3 |
| Rouge foncé à reflets bleuâ- | | | | Rouge clair. | | | |
| tre, régulier, lignées de bl. | | | | | | | |

| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|---|------|------|------|--|------|------|------|
| Pirzio | " | 1-50 | 4 | Pulverulenta | " | 1-25 | 5 |
| Beau blanc, très-grand, extra. | | | | Purpurea nova, Tourres . | " | 4 | 8 |
| Pisani | 5 | 10 | " | Queen of England, Fielder. | " | 2 | 8 |
| Imbriqué, tr.-plein, blanc, ligné ou tacheté de rose ou de carmin. | | | | Forme de l'Imbricata, rose extrêmement tendre, superbe ligne blanche au centre de chaque pétale. | | | |
| Plutone | 2 | 5 | " | — of Great Britain . . . | " | 2 | 8 |
| Rouge vif, ligné de blanc, Pæoniforme, très-beau. | | | | Admirable fleur, du plus beau rose satiné, de surchoix. | | | |
| Plutans | 2 | 4 | " | — Victoria, Priestley. . . | " | 1-50 | 5 |
| Plinio | 2 | " | " | Superbe variété, fleurs très-épaisses, d'un beau rouge, une ligne blanche au centre de chaque pétale. | | | |
| Pomponia aurea d'Italie . | 2 | 5 | " | Rachel Ruisch. | " | " | 2-50 |
| Globuleux, jaunâtre, très-beau. | | | | Beau rouge, souvent tacheté de blanc. | | | |
| Pomona | 5 | 10 | " | Ralemona d'Italie | 4 | 6 | " |
| Potentissima | 2 | 5 | " | Perfection du <i>Fordi</i> , pétales veinés et transparents, d'un rose foncé vers la conférence et très-clair dans tout le reste de la fleur, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Powhattan, Floy | 5 | 6 | " | Radaelli | 4 | 8 | " |
| Globuleux, carmin foncé. | | | | Radicans. | 5 | 6 | " |
| Pozzi | 5 | 10 | " | Radiata, Marquise Ridolfi . | 2 | 8 | " |
| Pratti | " | 1-50 | 4 | Rose clair, imbriqué très-régulièrement, superbe. | | | |
| Belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque, une strie blanche longitudinale au centre de chaque pétale. | | | | Ranunculiflora striata. . . | " | " | 5 |
| Prate Morendini | 2 | 4 | " | Rapallinii | 4 | 8 | " |
| Pressi rosea | " | " | 5 | Re d'Italia | 10 | " | " |
| Prince Albert, Chandler and Sons | " | 5 | 8 | Reevesii | " | " | 5 |
| Circonférence imbriquée, centre Pæoniforme, fond rose clair, entièrement saupoudré, ponctué et flammé de carmin, superbe. | | | | Fleur large, irrégulière, pétales en coquille, d'un rouge très-vif. | | | |
| Prince of Wales | 2 | 6 | " | — major | " | 1-25 | 5 |
| Rose satiné des plus délicats, plus foncé vers le centre, forme modèle admirable. | | | | Forme du <i>Reevesii</i> , mais bien plus grand, superbe. | | | |
| Prince de Troubetzkoi . . | 10 | " | " | Reevesiana | " | " | 5 |
| Princesse Mathilde | 2 | 4 | " | Rose bien imbriquée. | | | |
| Princess royal, Low. | " | 2 | 5 | Regina d'Inghilterra . . . | " | 2 | 5 |
| Dans le genre du <i>Triumphans</i> mais plus foncé. | | | | Belle facture, Pæoniforme, fond blanc, quelques larges striés roses. | | | |
| Princesse Baciocchi | 1-50 | 4 | " | Regine, L. Hellebuyck . . | " | 1 | 5 |
| Forme imbriquée, superbe, les quatre premiers rangs de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté, les autres sont ponceaux, à bandellettes blanches. | | | | Très-bonne fleur blanche, moyenne, à lignes carminées. | | | |
| Procastinans alba | 5 | 10 | " | Reines fleurs, Donkelaar. | 1-50 | 4 | " |
| Proserpine nova | 2 | 5 | " | Bien imbriqué, carmin foncé, rubanné de blanc. | | | |
| Preniland | 1-50 | 5 | " | Resplendens | " | " | 5 |
| Pulcherrima striata. | " | 2 | 4 | Rose éclatant, bien imbriqué, form. une coupe admir. | | | |
| Ponceau foncé brillant, marbré de grandes et petites taches blanches, charmant. | | | | Reticulata | " | 1-50 | 4 |
| Punctata, (invincible) . . . | " | " | 2 | Extra grand, semi double, pétales ondulés, en désordre, coul. briq. nuancée de rose. | | | |
| — major | " | " | 2-50 | Richardi | " | 1-25 | 5 |
| Pæoniforme, très-beau, fond blanc tacheté de rose. | | | | Rouge briqué. | | | |
| — pleno odoreta | " | 5 | 6 | Ridolfiana | " | 2 | 4 |
| — rosea | " | 5 | " | Fond blanc, à larges rubans, couleur de sang, quel- | | | |



| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|---|------|------|-----|---|------|------|------|
| ques pétales d'un rose tendre se détachent élégamment du fond, tous les autres très-régulièrement disposés, superbe fleur, 1 ^{er} ordre. | | | | Soutangiana plenissima . | 2 | 4 | " |
| Ristori | " | 1-50 | 4 | Beau rose, bien imbriqué, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Forme semi imbriquée, rouge violacé, large bandes blanches, 1 ^{er} ordre, superbe. | | | | Sovereign, Low | 6 | 10 | " |
| Rising sun, (Mourant) . . . | 2-50 | " | " | Blanc accidenté de carmin, bien double, pétales, bien imbriqués, de près de 5 pouces de diamètre. | | | |
| De toute beauté, tr.-plein et parfaitement imbriqué. | | | | Spectabilis | " | 1-50 | 4 |
| Rival | " | 1-25 | 5 | Magnifique Camellia globuleux, bien plein, blanc de lait, tacheté de rose, sup. | | | |
| Pæoniforme, rouge pon- ceau foncé, pétales du centre tous flammés de blanc. | | | | Spiralis | " | 5 | " |
| Robertsoni | " | 4 | 8 | Rouge cerise, bien imbr. | | | |
| Ecarlate, forme très-fine. | | | | Spinio | 5 | 15 | 25 |
| Romanow | 2 | 4 | " | Beau blanc, bien imbriqué, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Rosa Mundii | " | " | 2 | Splendens novissima . . . | 5 | 6 | " |
| Bien imbriqué, rose strié et pointillé de rouge sang et de carmin. | | | | Splendissima alba | 2 | 5 | " |
| Rollissonii | " | " | 5 | Beau blanc, imbriqué. | | | |
| Beau blanc, très-florifère. | | | | Spofforthii | " | " | 5 |
| Rosa sinensis | " | " | 5 | Très-grande fleur blanche, souvent strié de carmin. | | | |
| Beau rose, très-grand. | | | | Squamosa | " | 1-50 | 4 |
| Rosa Denholm | " | 1-50 | 5 | Très-beau, rouge très-bien imbr., parfois bordé de bl. | | | |
| Très-régulier, rose pâle, transparent, tantôt unicolore, tantôt strié de blanc. | | | | — <i>alba</i> | 5 | 6 | 15 |
| — <i>nova de la Chine</i> | " | " | 5 | Stenano | 1-50 | 5 | " |
| Rosetta | " | 1 | 5 | Strofolata | 1-50 | 5 | " |
| Pæonif., d'un rose très-agréable, parfois ligné de blanc pur. | | | | Stockwelliana | 2 | 4 | " |
| Rossi | " | " | 5 | Sterope | " | 1-50 | 4 |
| Rothschildiana | " | 2 | " | Très-grand, rouge foncée bien imbriqué, le cent. relevée. | | | |
| Rubra Maxima nova | 2 | 4 | " | Stephanie | " | " | 5 |
| Rubens, Moens. | 2 | 5 | " | Striata, (variegata) | " | " | 2-50 |
| Rubescens striata, Low . . . | " | 2 | 5 | Strassaldo | 1-50 | 5 | " |
| Rouge saumoné, très-larges, pétales ronds, ligné de blanc, 1 ^{er} ordre. | | | | Striped major | " | " | 5 |
| Rubra venusta | " | " | 5 | Sulcata, (Belle Irene) . . . | " | 1 | 5 |
| Saccoiana | " | " | 4 | Forme imbriquée, couleur blanche, une strie jaune paille s'étend sur chaque pétale du centre à la circonférence, très-beau. | | | |
| Rose, blanchissant vers le centre, superbe, 1 ^{er} ordre. | | | | Superba, (Vandesiana carn.) | 1 | 2 | 4 |
| Saffo | 1 | 5 | 6 | Fleur de première grand., saumon foncé, centre large, arrangement des <i>Anemone-flores</i> , mais très-régulier et extrêmement étoffé, unique dans son genre, feuillage superbe, très-large et très-épais. | | | |
| Pæoniforme, rouge strié. | | | | Susannah | " | " | 5 |
| Salicifolia, Floy | " | 5 | " | Très-beau, forme imbriquée, pétales bien arrondis, rouge clair vif, reflet de saumon et accidenté de bl. | | | |
| D'un beau rouge brillant, forme en globe, magnifique. | | | | Sweetii | " | " | 2 |
| Santifiniana speciosa | " | 1-50 | 4 | Moyenne grandeur, rouge rosé, strié de blanc. | | | |
| Schiavone, Casoretti | 5 | 6 | " | Sweetiana, Colvill | " | " | 5 |
| Schachkœnigin | " | 1-50 | 5 | Pæoniforme, très-beau, blanc rosé, strié, moucheté et lavé de carmin. | | | |
| Serra | 5 | " | " | | | | |
| Serratifolia | " | 1-25 | 5 | | | | |
| Très-joli, strié. | | | | | | | |
| Sherwoodii | 1 | 2 | 6 | | | | |
| Cerise vif, strié de blanc, forme imbriquée, 1 ^{er} ordre. | | | | | | | |
| Sophia d'Italie | " | 2 | " | | | | |
| Très-grand, rouge vif. | | | | | | | |

| | FR. | FR. | FR. | | FR. | FR. | FR. |
|--|------|------|-----|---|------|------|-----|
| Symmetrica | " | 2 | " | plein, très-beau blanc, à centre paille, 1 ^{er} ordre. | " | | |
| Rose, forme imbriquée, modèle. | | | | Vesuvio | " | 1-50 | 3 |
| Tagliani | 2 | 4 | " | Rouge très-vif, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Terziana | " | 2 | 4 | Vexillo di flora | 2 | 5 | " |
| Très-grande fleur, pétales étalés, carmin vif, ceux du centre chiffonnés, flagellés de blanc. | | | | Rose imbriqué, tr.-grand, superbe. | | | |
| Teutonia , <i>Gruneberg</i> . . . | " | 2 | 6 | Victor Hugo | 2 | 5 | " |
| Superbe, à sa propension, à porter constamment des fleurs toutes blanches et toutes rouges, très-belle forme, 1 ^{er} ordre. | | | | Victoria Antwerpensis | " | " | 5 |
| Thomasini | " | 5 | " | Fond blanc pur, quelques fois accidenté de laque, ongles paille. | | | |
| Grande fleur, forme du double blanc, rose brillant, légèrement marginé de blanc, 1 ^{er} ordre. | | | | Villageoise | " | 1-50 | 4 |
| Thompsoni superba | " | " | 5 | Forme élégante, blanc rosé, bien ponct. depourp., tr.-joli. | | | |
| Tornielli d'Italie | 2 | 6 | " | Violacea superba | " | 1-50 | 5 |
| Rouge carminé, magnifique, à bandelettes blanches. | | | | Brillant feuillage, fleurs de belle forme, beau carmin à reflets violets. | | | |
| Tourresiana | " | 1-50 | 4 | Visconti nova vera , (<i>Casoretti</i>) | 4 | 10 | " |
| Charmant, forme d' <i>Anemone</i> , cerise vif, à nervures pourpres, 1 ^{er} ordre. | | | | Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. | | | |
| Traversii | " | " | 5 | Victoria magnosii | " | 4 | 10 |
| Beau rose, maculé de blanc. | | | | Rouge imb., strié de blanc. | | | |
| Tricolor | " | " | 2 | Wadi | " | " | 5 |
| Triphosa | " | 2 | 4 | Pæoniforme, blanc pur. | | | |
| Triumphaus amabilis , <i>Van Houtte</i> | " | 2 | 5 | Waltichii | " | " | 5 |
| Magnifique Camellia, rose. | | | | Forme de l' <i>Imbricata</i> , couleur plus foncée. | | | |
| Triumphaus | " | " | 5 | Wagonii | 5 | 6 | " |
| Très-grande et très-belle fleur Pæoniforme, d'un rose brillant. | | | | Wardi | " | " | 2 |
| Tsubacki | " | " | 2 | Rouge. | | | |
| Rose saumoné, Pæoniforme. | | | | Washingtoni , <i>Gunnell's</i> | 2 | 8 | " |
| Turnbulli | " | " | 5 | Beau rouge, strié de blanc. | | | |
| Ecarlate. | | | | Weibanchei | " | " | 2 |
| Ugoni d'Italie | 5 | 6 | " | Blanc, Pæoniforme. | | | |
| Valeriana | " | 1-50 | 5 | Wilbrahamii | " | " | 2 |
| Variegata alba | 1-50 | 5 | " | Rose carminé. | | | |
| Vantini d'Italie | 1-50 | 4 | " | Wilderii | 25 | " | " |
| Varischi , (<i>général Zucchi</i>). | " | 2 | 6 | Rose tendre, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Jolie, imbriqué, rose carmin, strié et moucheté de blanc. | | | | White perfection | 2 | 4 | " |
| Venere | " | 2 | 6 | William the IVth | " | " | 5 |
| Forme imbriqué, rouge éclatant. | | | | Bien imbriqué, rouge laque foncé, très-beau. | | | |
| Verschaffeltiana , <i>Alexand. Verschaffelt</i> | 5 | 6 | " | Walter Frederic Campbell | 1-50 | 5 | " |
| Bien imbriqué, rose vif, pétales marqués, pour la plupart d'une petite strie blanche sur le limbe, tr.-beau. | | | | Large fleur Pæoniforme, rose satiné tacheté de blanc, bords fimbriés et transparens, 1 ^{er} ordre. | | | |
| Vestalis | " | 2 | 6 | Woodsii | " | " | 2 |
| Forme du <i>Carswelliana</i> , mais plus grand et plus | | | | Très-beau, très-grand, rose. | | | |
| | | | | — <i>alba</i> | 2 | 4 | " |
| | | | | Fleur très-grande, pétales de la circonférence blanc de lait, à larges bandes, à taches et à lignes carmin. | | | |
| | | | | Youngii | " | " | 2 |
| | | | | Grande fleur, d'un beau carmin. | | | |
| | | | | Zeffiro | " | 1-50 | 5 |
| | | | | Forme imbriquée, carmin très-beau, 1 ^{er} ordre. | | | |

Je fournis à mon choix :

| | |
|--|---------|
| 100 belles variétés différentes de Camellia pour . . . | fr. 100 |
| 100 Camellia en boutons en mélange . . . | " 150 |
| 100 " simples à greffer . . . | 35 à 40 |

CINERARIA.

| | |
|---|----------------|
| 20 belles et nouvelles variétés obtenus à Gand, avec noms, pour . . . | Fr. C. 18 " |
| 10 Des mêmes, pour . . . | 9 " |

AZALEA INDICA DE CHOIX.

ABRÉV. (K. et P.) *Knight et Perry.* (J.-M.) *Jacob-Mackoy.* (V.) *Alex. Verschaffelt.* (Bⁿ P.) *Baron Pronay.* (R.) *S. et J. Rinz.* (V. H.) *L. Van Houtte.* (D. L.) *De Loose.* (A. V. G.) *Auguste Van Geert.*

Je fournis les anciennes variétés sans noms, en mélange, en boutons et fortes touffes, à 75 francs, le cent.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|----------------------------------|--------|------------------------------|---------|--|---------|
| Aberdinii (K. et P.) . . . | 5 " | Elate rubro pleno . . . | 1 à 3 " | Nec plus ultra (<i>tricol.</i>) (V.) | 1 " |
| Argemomata (<i>espèce de la</i> | | Espartero (K. et P.) . . . | 4 " | Optima (K. et P.) . . . | 3 " |
| <i>Chine</i>) . . . | 5 " | Flora (K. et P.) . . . | 2 " | Ovata (<i>esp. de la Chine</i>) | 5 " |
| Alba striata (K. et P.) . . . | 5 " | <i>Fielder's white</i> . . . | 1 " | Perryana (K. et P.) . . . | 5 " |
| Arnmatia (K. et P.) . . . | 2 " | Fulgens (K. et P.) . . . | 2 " | Prevalens . . . | 4 " |
| Aurantiacasuperb. (K. et P.) | 2 " | Formosum aurantia . . . | 2 " | Picturata (K. et P.) . . . | 4 " |
| Amarantina (J.-M.) . . . | 5 " | Fimbriata . . . | 5 " | Purpurea perfecta . . . | 5 " |
| Apollo (K. et P.) . . . | 2 " | Frostii (K. et P.) . . . | 5 " | Phœnecia alba (K. et P.) . . | 2 " |
| Barbata (V.) . . . | 1-50 | Garland (K. et P.) . . . | 2 " | Punctata superba (K. et P.) | 2 " |
| Baron de Pronay . . . | 1 " | Goliath (R.) . . . | 2 " | Prima donna (K. et P.) . . . | 2 " |
| Bella (K. et P.) . . . | 5 " | Grandiflora rosea . . . | 2 " | Præclara (K. et P.) . . . | 2 " |
| Blanda (K. et P.) . . . | 2 " | — extra . . . | 2 " | Pilosa (K. et P.) . . . | 2 " |
| Briza (K. et P.) . . . | 1 " | Gledstanesii . . . | 1 à 5 " | Prince Albert (K. et P.) . . | 2 " |
| Buckingham (K. et P.) . . . | 4 " | Helena . . . | 5 " | Queen perfection . . . | 2 " |
| Burlingtonii (K. et P.) . . . | 5 " | Holfordii (K. et P.) . . . | 4 " | — <i>Victoria.</i> . . . | 5 " |
| Coronata (K. et P.) . . . | 2 " | Iveryana . . . | 5 " | Reyndersiana (V.) . . . | 1 " |
| Clothilde (V.) . . . | 5 " | King . . . | 4 " | Rubra aurantia . . . | 2 " |
| Colorans (K. et P.) . . . | 2 " | Lacteola striata (A. V. C.) | 10 " | Rosea elegans . . . | 2 " |
| Comosa (K. et P.) . . . | 2 " | Lateratia . . . | 1 à 3 " | — purpurea (K. et P.) . . | 2 " |
| Cuprea (B ⁿ P.) . . . | 2 " | — elegans . . . | 5 " | Species nova de la Chine | 2 " |
| Comte de Flandre . . . | 5 " | — grandiflora . . . | 2 " | Splendens (<i>Henderson</i>) . . . | 1 " |
| Danielsiana amabilis . . . | 2 " | <i>Leucomagiste.</i> . . . | 2 " | Semi double Pinck . . . | 2 " |
| — superba . . . | 1 " | Loosii (D. L.) . . . | 4 " | Striata Calamistrata . . . | 2 " |
| Delecta (K. et P.) . . . | 2 " | Maculata superba (K. et P.) | 5 " | Sinensis . . . | 2 " |
| Duc de Brabant (V. H.) | 5 " | Multiflora (J.-M.) . . . | 4 " | — versicolor . . . | 4 " |
| Diana . . . | 2 " | Magnifica (K. et P.) . . . | 2 " | Tricolor (<i>nec plus ultra</i>) | 1 " |
| Duke of Wellington . . . | 5 " | Moritz V, Bethmann (R.) | 1 " | Trotheriana (K. et P.) . . . | 4 " |
| Exquisita (K. et P.) . . . | 2 " | Nedersii . . . | 5 " | Van Geertiana (A ^{te} V. G.) | 5 " |
| Excellens (K. et P.) . . . | 2 " | New seedling (Ball) . . . | 5 " | Variegata . . . | 1 à 3 " |

FUCHSIAS.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Apollo, <i>Passingham</i> . . . | 1 " | Atrosanguinea, <i>Salter</i> . . . | 1 " | <i>Baudouin</i> , <i>Salter</i> . . . | 50 |
| Artemisia, <i>Salter</i> . . . | 1 " | <i>Beauty of Dalston</i> . . . | 50 | <i>Boyeidieu</i> . . . | 1-50 |
| Armide, <i>Dubus</i> . . . | 50 | — of <i>Chamford</i> . . . | 2 " | <i>Chinois</i> , <i>Salter</i> . . . | 50 |
| Aurantiaca, <i>Dubus</i> . . . | 50 | — of <i>Leeds</i> . . . | 1 " | Chauvieri . . . | 50 |
| Attractor . . . | 50 | Bianca, <i>Salter</i> . . . | 1 " | Clara . . . | 50 |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|---|--------|
| Climax | 1 » | <i>King John</i> | » 50 | <i>Queen Victoria</i> , Harrison » | 75 |
| Carolina, <i>Pince</i> | » 50 | <i>La Esmeraldo</i> | 1 » | — of Saba | 1 » |
| Coletti | 2 » | <i>La Reine Baccana</i> | 1 » | <i>Rigalette</i> , Dubus | 1 » |
| Cormackii | » 50 | <i>Lady Maria</i> | 1 » | <i>Reines Français</i> , Salter 1 » | |
| <i>Daniel de Foé</i> , Salter | 1 » | — <i>W. Fawcett</i> | 2 » | <i>Roi de Rome</i> | 2 » |
| <i>Duchess of Sutherland</i> | 1 » | <i>Leonora</i> | » 50 | Rogersiana | » 50 |
| <i>Duke of Cornwall</i> , Pas- singham | 1 » | Leucantha | 1 » | <i>Rodolphe</i> | 1 » |
| <i>Enchantress</i> | 2 » | <i>Lord Sandon</i> , Rogers | 1 » | <i>Sans pareil</i> | 1 » |
| <i>Etoile de Versailles</i> , Salter 1 » | | Ludovici | 1 » | <i>Scarlatine reflexa</i> | 2 » |
| Eximea | 1 » | Macrantha | 2 » | <i>Screamouche</i> | 1 » |
| Exoniensis | » 50 | Marsena | 2 » | <i>Serratifolia</i> | » 50 |
| Flavescens | 2 » | Mentor, <i>Salter</i> | 1 » | — <i>variété plus florifère</i> 1 » | |
| <i>Fleur de Marie</i> | 1 » | <i>Mini Moulin</i> | 1 » | Sidmouthi | » 50 |
| Florence, Epps | » 50 | <i>M.^{me} Bracy</i> , Salter | 1 » | <i>Sir W. Magney</i> , Ivery | 1 » |
| <i>Fanny Essler</i> | 1 » | — <i>Thibaut</i> , Salter | 1 » | <i>Star of the West</i> | 1 » |
| <i>Félicité</i> , Salter | 1 » | Modesta, <i>Smith</i> | » 50 | <i>Sylphide</i> , Salter | 1 » |
| <i>Géant de Thielt</i> | 2 » | <i>Murph</i> | 1 » | <i>Triumpe</i> | 2 » |
| Gigantea, <i>Smith</i> | » 50 | <i>Napoléon</i> , Dubus | 1 » | <i>Unique</i> , Paxton's | » 50 |
| <i>Gladiator</i> , Salter | 1 » | <i>One in the ring</i> | 2 » | Venusta, <i>Smith</i> | » 50 |
| <i>Goldfinch</i> , (Harrison) | » 75 | <i>Pearl</i> , Epps | » 50 | <i>Venus Victrix</i> | » 50 |
| <i>Hailstorm</i> | 1 » | <i>Phosperus</i> , Salter | 1 » | <i>Vesta</i> , <i>Harrison</i> | » 50 |
| <i>Hector</i> , <i>Smith's</i> | » 50 | <i>Prince of Wales</i> , <i>Pawley's</i> » | 50 | <i>White perfection</i> | 1-50 |
| <i>Jeanne d'Arc</i> | 1 » | <i>Princesse Alice</i> | » 50 | <i>Je fournis à mon choix</i> 12 belles variétés, pour 5 » | |
| <i>Imperatrice Joséphine</i> | 1 » | — <i>de St-Dizier</i> | 1 » | 25 — — — pour | 10 » |
| <i>Jupiter</i> | 1 » | <i>Pride of Peckham</i> | » 50 | | |
| | | <i>Punch</i> , Salter | 1 » | | |

GERANIUMS.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|---|--------|
| Anais (<i>Chauviere</i>) | 2 » | <i>Empress (Chandler's)</i> | 1 » | <i>Maid of Saragossa</i> | 1 » |
| Ackbar | 1 » | <i>Enchantress (Wilson)</i> | 1 » | Milo | 2 » |
| Armintor (<i>Foster</i>) | 1 » | <i>Fair Maid of Devon</i> | 1 » | Minerva (<i>Foster</i>) | 5 » |
| Augusta (<i>Hoyle</i>) | 1-50 | <i>Favorita (Beck)</i> | 3 » | <i>M.^r De Bois Milon</i> | 2 » |
| <i>Beauté parfaite (De May)</i> 1-50 | | — (<i>Foster</i>) | 1 » | <i>Merry monarch (Catteugh)</i> 2 » | |
| Beauty | 1 » | Flora | 1 » | <i>Mustée (Beck)</i> | 2 » |
| Berthe (<i>Foster</i>) | 5 » | Fleurette | 2 » | <i>Nestor (Foster)</i> | 1 » |
| Bizarrrre (<i>De Jonghe</i>) | 1-50 | Firebrand | 1 » | <i>Nec plus ultra (De May)</i> 1 » | |
| Brillant (<i>Parson</i>) | 1 » | Gloire des parisiens (<i>Chauviere</i>) | 1 » | Oberon (<i>Hodge</i>) | 1 » |
| Camillo | 1 » | Grandis | 1 » | Orpheus (<i>Foster</i>) | 3 » |
| César | 2 » | Général Tilly | 1 » | Painted Lady (<i>Foster</i>) | 3 » |
| Cœlestial (<i>Chandler</i>) | 1-50 | Glansryk | 1 » | Pauline de May | 1 » |
| Choix d'un amateur (<i>De</i> <i>Jonghe</i>) | 1-50 | Gloria Atrebatensis | 1 » | Pericles (<i>Foster</i>) | 3 » |
| Constellation (<i>Garth</i>) | 1 » | Heroine (<i>De May</i>) | 2 » | Præstans | 2 » |
| Conservative | 1 » | Hyble (<i>Foster</i>) | 1 » | Pulchellum (<i>Forster</i>) | 1 » |
| Claudiana | 1 » | Hebé (<i>Beck</i>) | 1 » | <i>Pulcherrinum (De May)</i> 1 » | |
| Clorinde | 1 » | Jenny Colon | 1 » | Princ. ^e Sophie d'Orange (<i>De Jonghe</i>) | 1 » |
| Cyrus | 1 » | Julia (<i>Chandler</i>) | 1 » | Princesse Léopoldine (<i>De</i> <i>Jonghe</i>) | 1 » |
| Conflagration (<i>Foster</i>) | 1 » | Japphæ | 1 » | — Royal (<i>Lyn</i>) | 1 » |
| Desdemona | 1-50 | Isabella (<i>Hoyle</i>) | 1-50 | Pluto (<i>Turtell</i>) | 1 » |
| Dido (<i>Foster</i>) | 1 » | Invincible (<i>De May</i>) | 1 » | Pride of Surrey (<i>Gainé's</i>) 1 » | |
| Duc de Brabant (<i>De Jonghe</i>) 1 » | | Lady Sale (<i>Gaskell</i>) | 1 » | Queen of the Fairies (<i>Garth</i>) 1 » | |
| Duke of Hamilton (<i>Groom</i>) 1 » | | — Villiers | 2 » | — Philippe (<i>Garth</i>) | 1 » |
| Duke of Cornwall | 1 » | Lavalliere (<i>De May</i>) | 1 » | — Victoria (<i>Shepherd's</i>) 2 » | |
| Duke of Wellington (<i>Catt-</i> <i>leugh</i>) | 2 » | Lady Essex | 1 » | Retour de S ^{te} Hélène | 1 » |
| Elegans nova (<i>Gainé's</i>) | 1 » | — of the Lake | 1 » | Rising sun | 1 » |
| Egbert (<i>Gainé's</i>) | 1 » | Leonora (<i>Beck</i>) | 1 » | Rembrandt | 1 » |
| Emperor (<i>Hodge's</i>) | 1 » | Latona (<i>De May</i>) | 1 » | Reward (<i>Russell</i>) | 1 » |
| — Nicolas (<i>Silverlock</i>) 1 » | | Madaline (<i>Lumsden</i>) | 1 » | Ruward (<i>De Jonghe</i>) | 1-50 |
| | | Mars (<i>Garth</i>) | 3 » | | |



| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Sir Robert Peel (<i>Foster</i>) | 1 » | Talisman | 1 » | Witch (<i>Wise</i>) | 1 » |
| Saphir (<i>Foster</i>) | 1 » | Theresa | 1 » | Wonder (<i>Garth</i>) | 1 » |
| Saxon king (<i>Gaine's</i>) | 1 » | Triumphe de Flandre | | Zenobia (<i>Beck</i>) | 1-50 |
| Sunrise | 1 » | (<i>De Jonghe</i>) | 2 » | Zonnestrael (<i>De Jonghe</i>) | 1 » |
| Sultana (<i>Foster</i>) | 1 » | Unique (<i>Hoyle</i>) | 1 » | Les anciennes variétés non | |
| Stewartii | 1-50 | Vesuvius | 1 » | sur ce catalogue à 50 centi- | |
| Symmetry (<i>Garth</i>) | 1 » | Voltaire | 1 » | mes pièce. | |

VERBENA (nouveau.)

(Vervaines.)

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Amalthée | » 50 | Emperor | » 50 | Lucrece | 1 » |
| Atrosanguinea (<i>Conway</i>) | » 50 | — of China | » 50 | Model | » 50 |
| Barkerii | » 50 | Excelsa | » 50 | Mulberry | » 50 |
| Beauté suprême | » 50 | Enchantress | » 50 | Princess Hélène | » 50 |
| Belle pompadour | » 50 | Erminia | 1 » | — royal | » 50 |
| Boule de feu | » 75 | Favourite | » 50 | — Marie | » 50 |
| Burleyana | » 50 | Glow-worm | » 50 | Queen of roses | » 50 |
| Captivation | » 50 | Grand duke | » 50 | Rose d'amour | » 50 |
| Champion | » 75 | Hamlet | » 50 | Ramona | » 50 |
| Charlwoodii | » 50 | Harlequin | » 50 | Reine des Français | » 50 |
| Clorinde | 1 » | Heloise | » 50 | Rosa Mundi | » 50 |
| Comte de Paris (<i>Du Foy</i>) | » 50 | Ibrahim-Pacha | » 50 | Sir Robert Peel | » 50 |
| Cyclops | » 50 | Impératrice Joséphine | | St. Margareth | » 50 |
| Defiance (<i>Robinson</i>) | » 50 | (<i>Conway</i>) | » 50 | Surprise (<i>Henderson</i>) | » 50 |
| Diversity | » 50 | La reine | » 50 | Speciosissima (<i>Conway</i>) | » 50 |
| Duc d'Aumale | » 75 | Lady Peckenharn | » 50 | Turenne | » 50 |
| Duchesse d'Orléans | » 50 | Louis-Philippe | » 50 | White perfection | » 50 |
| Emma (<i>Conway</i>) | » 75 | Lord John Russell | » 50 | Wonder of Scarletts | » 50 |

CONIFÈRES.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|----------|--------------------------------------|----------|--|----------|
| Araucaria brasiliensis | 2 » | Cupressus torulosa . 1 à 15 » | | Pinus longifolia . . . 5 à 10 » | |
| — — la douzaine | 20 » | Dacrydium cupressi- | | — lanceolata . . . 1-50 à 6 » | |
| — — fort, la pièce | 50 » | mum très-fort 300 » | | — Luscombiana | 8 » |
| — Cunningham. tr.-fort 550 » | | — Franklin | 10 » | — mexicana | 5 » |
| — 11/2 pied de haut 100 » | | — taxifolium tr.-fort 175 » | | — montezuma | 6 » |
| — — belle greffe | 25 » | — — | 5 à 40 » | — morindo | 2 à 20 » |
| — — bouture | 10 » | Dammara alba greffé | | — patula | 6 » |
| — — excelsa de gr. 50 à 100 » | | 15 à 25 » | | Podocarpus latifolius | |
| — — tête greffé | 25 » | — — de graine | 60 » | très-fort | 150 » |
| — Bidwelliana | 15 » | — australis de graine | | — — petit | 4 » |
| — — gracilis | 25 » | 2 mètres | 175 » | — longifolius | 2 » |
| — — imbricata 1-50 à 15 » | | — — petit | 5 » | — Mackayi | 5 » |
| Callitris australis | 2 » | — orientalis (tête) | 50 » | — mucronatus | 5 » |
| Cunninghamia lanceol. 1-50 » | | — — petit | 5 » | — purdieanus | 5 » |
| — — fort de graine 5 à 6 » | | Frenelia pendula | 4 » | — totara fort | 50 » |
| Cedrus deodora, petit | 1 » | Juniperus decumbens. 2 » | | — — | 2 à 6 » |
| — — fort | 6 à 15 » | — tetragona | 5 » | Taxodium Horsfalliae | 5 » |
| Cryptomeria Japon. 5 à 10 » | | — mexicana | 2 à 5 » | — sempervirens | 2 à 10 » |
| — — superbes exem- | | — phoenicia elegans | 5 » | — sinense | 5 » |
| plaires, fort de | | Phyllocladus asplenif. 25 » | | Taxus baccata fol. aur. | |
| 25 à 40 » | | — trichomanoides très | | marg. | 2 » |
| Cupressus juniperoides 1 » | | fort | 125 » | Thuya aurea | 8 » |
| — Mexicana | 2 » | — — | 4 à 25 » | — intermedia | 4 » |
| — pendula | 1 » | Pinus canariensis | 4 » | — pendula | 4 » |
| — Reinwardii | 5 » | — Devoniana | 6 » | — sps. de la Chine | 5 » |

RHODODENDRUMS.

N. B. Les sortes précédées d'une (*) passent l'hiver en pleine terre.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| Altaclarens | 1-50 | Arboreum hybr. Roylii . . | 3 | * Hyacinthiflorum pleno . | 1-50 |
| — magnum | 2 | * — — rosea delicatis- | | * Maximum | 1 |
| — roseum | 2 | — — — — — sima (V. G.) | 2 | * Pardoloton | 2 |
| — superbum | 2 | * — — — — — Smithii | 2 | * Ponticum en boutons, | |
| — triomphans | 2 | * — — — — — elegans | 2 | <i>le cent.</i> | 50 |
| * Anthopogon | 4 | * — — — — — splendens | 2 | * — — — — — album | 1-50 |
| Arboreum | 2 à 8 | * — — — — — triumphans | 2 | * — — — — — coccineum | 1-50 |
| — azaleæformis | 4 | * — — — — — venustum | 2 | * — — — — — fol. eleg. variegatis . | 1-50 |
| — album (ferrugineum) . | 2 | * — — — — — Rollissonii | 4 | * — — — — — fol. pictus | 1-50 |
| * — — — — — hybr. argenteum . . | 2 | * — — — — — elegans | 4 | * — — — — — fl. pleno | 1 |
| * — — — — — amabile | 3 | * — — — — — Woolerii | 5 | * — — — — — imbricatum | 1 |
| * — — — — — atropurpureum . | 2 | * — — — — — Youngii | 2 | * — — — — — Lowii | 1-50 |
| * — — — — — Albertus | 3 | * Azaleoides | 1 à 2 | * — — — — — lacteola | 1 |
| * — — — — — Bedfordii | 2 | — — — — — var. Cantonii | 1 | * — — — — — nivaticum | 1 |
| * — — — — — blandum | 2 | * — — — — — Torloniana (jaune) . | 4 | * — — — — — Nazarethinum | 1 à 2 |
| * — — — — — hiburgensis | 2 | Barbatum | 5 à 10 | * — — — — — nerifolium | 1 |
| * — — — — — bouquet tendre . . | 3 | Barbatissimum | 15 | * — — — — — foliis varieg. . . . | 1 à 2 |
| * — — — — — cardinalis | 2 | * Campanulatum | 2 à 5 | * — — — — — pictum novum | 1-50 |
| * — — — — — clyto | 3 | * — — — — — hybridum | 3 | * — — — — — pyramidaliflora pleno | |
| — — — — — carneum bratum . | 3 | * — — — — — album | 4 | <i>1-50 à 8</i> | |
| * — — — — — cerise | 2 | * — — — — — robustum | 6 | * — — — — — rosea pleno | 1-50 |
| — — — — — Coriolan | 3 | * — — — — — strictum | 5 | * — — — — — Smithii | 1-50 |
| — — — — — Général Weyss . . . | 3 | * Catawbiense bicolor . . | 4 | * — — — — — alba | 1-50 |
| — — — — — perfectum | 3 | * — — — — — celestina | 4 | * — — — — — Punctatum | 1 à 2 |
| — — — — — Cunninghamii | 2 | * — — — — — Ewertsiana | 4 | Rollissonii | 2 à 6 |
| * — — — — — tigrinum | 2 | * — — — — — elegans | 4 | — — — — — varietas | 2 |
| * — — — — — Charles-Quint . . . | 3 | * — — — — — fl. albo | 1-50 | * Victoria (Pince) . . . | 3 |
| — — — — — Drummondii | 2 | * — — — — — fl. pleno | 1-50 | Zeylanicum | 2 à 6 |
| — — — — — Duncaster | 2 | * — — — — — fastuos. pl. (V. H.) . | 5 | | |
| * — — — — — dark | 2 | * — — — — — grandiflora | 4 | | |
| * — — — — — elegans | 2 | * — — — — — new white seedling . | 4 | | |
| * — — — — — favour (Knights) . | 3 | * — — — — — picta | 4 | | |
| * — — — — — (V. G.) | 3 | * — — — — — purpurea grandifl. . | 4 | | |
| * — — — — — formosum (Cun- | | * — — — — — elegans | 4 | | |
| ningham) | 3 | * — — — — — splendens N° 1 . . . | 4 | | |
| — — — — — foliis variegatis . . | 4 | * — — — — — N° 2 | 4 | | |
| — — — — — Gén. l'Olivier . . . | 3 | * Caucasicum | 4 | | |
| * — — — — — Harringtoni | 3 | * — — — — — plusieurs variétés, | | | |
| — — — — — Hibbertii | 2 | <i>pièce à</i> | 5 | | |
| — — — — — Homère | 3 | * Chamæcistus | 15 | | |
| * — — — — — jolie fille de Gand . | 3 | Cinnamomum | 2 à 5 et 10 | | |
| * — — — — — juglans | 1 | * Dauricum | 75 | | |
| — — — — — Knightii | 2 | Farrère | 5 | | |
| — — — — — king (Rollisson) . . | 3 | * Ferrugineum | 75 | | |
| * — — — — — mignon | 2 | * — — — — — maximum | 1 | | |
| — — — — — Manglesii | 2 | * — — — — — Fragrans | 1-50 | | |
| * — — — — — nec plus ultra . . . | 2 | Gibsonis | 5 | | |
| * — — — — — Nobleanum | 2 | Gloria Gandavensis . . | 6 | | |
| * — — — — — phoenecium | 2 | * Gowenianum | 1 | | |
| — — — — — Paretti | 3 | * Glenyanum | 3 | | |
| — — — — — Prince de Crowie . . | 3 | * Hirsutum | 1 | | |
| * — — — — — princeps | 2 | * — — — — — arborescens | 1 | | |
| * — — — — — Russellianum | 2 | * — — — — — foliis variegatis . . | 2 | | |
| — — — — — rosea (Smith) | 2 | * Hybridum | 1 | | |

Variétés à fleurs jaunes.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| — aureum | 6 |
| — — — — — triumphans | 8 |
| — — — — — varietas | 8 |
| — — — — — carneum elegantiss. . | 4 |
| — — — — — decorum | 4 |
| — — — — — fine large buff . . . | 8 |
| — — — — — flavum glaucum . . . | 8 |
| — — — — — highclare Yellow . . | 5 |
| — — — — — norbitonense | 6 |
| — — — — — luteum (Knight) . . . | 10 |
| — — — — — spectabilis grandifl. . | 6 |
| — — — — — Yellowish (Cunning- | |
| gham) | 6 |
| — — — — — Yellow (Smith) . . . | 6 |
| — — — — — superbum | 8 |
| — — — — — JAVANICUM | 25 à 75 |
| — — — — — TORLONIANA | 4 |

Semis de Rhododendrum.

| | |
|-------------------------------|-----|
| Campanulatum fort, le | |
| <i>cent.</i> | 200 |
| Arboreum, plusieurs | |
| <i>variétés, le cent.</i> . . | 60 |
| Ponticum de 2 ans . . | 18 |

CHOIX

D'Arbres, Arbrisseaux et Arbustes de Plaine Terre.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|----------------------------------|--------|---|----------|------------------------------------|--------|
| Abies excelsa | » 50 | Azalca (<i>les plus belles</i> | | Clematis viticella rub. » | 50 |
| — <i>Menziesii</i> | » 3 » | <i>variétés obtenus</i> | | Clethra alnifolia. | » 50 |
| — <i>morindo</i> | » 2 » | <i>par Mortier et</i> | | Cornus mascula fol. arg. | |
| — <i>nigra</i> | » 1 » | <i>Verschaell), la</i> | | <i>varieg.</i> | 1-50 |
| Acer campestre fol. ma- | | <i>pièce</i> | 1 à 5 » | — <i>sang. fol. var.</i> | » 50 |
| <i>culatis</i> | » 1 » | Benthamia fragifera | » 1 » | — <i>stricta fol. arg.</i> | » 50 |
| — — <i>variegatis</i> | » 3 » | Berberis aquifolium | » 1 » | — — <i>aureis</i> | » 50 |
| — <i>laciniatum</i> | » 1 » | — <i>angulosa</i> | » 5 » | Corylus americana | » 1 » |
| — <i>Negundo</i> | » 1 » | — <i>actinocantha</i> | » 5 » | — <i>laciniata</i> | » 1 » |
| — <i>pseudo platanus f. v.</i> | » 1 » | — <i>dulcis</i> | » 1 » | — <i>purpurea</i> | » 75 |
| — <i>striatum</i> | » 1-50 | — <i>empetrifolia</i> | » 1 » | Cotoneaster melanoc. » | 75 |
| Æsculus Hippocastanum » | 75 | — <i>fascicularis</i> | » 1-50 | — <i>microphylla</i> | » 1 » |
| — — <i>fol. laciniatis</i> » | 4 » | — <i>robusta</i> | » 5 » | — <i>uva ursi</i> | » 1 » |
| — <i>variegatis</i> | » 1 » | — <i>glumacea</i> | » 2 » | Cratægus aria | » 1 » |
| — <i>carnea</i> | » 1 » | — <i>intermedia</i> | » 1-50 | — <i>aurea</i> | » 1-50 |
| — <i>discolor</i> | » 1 » | — <i>petiolaris</i> | » 5 » | — <i>coccinea</i> | » 1 » |
| — <i>lutea</i> | » 1 » | — <i>repens</i> | » 1 » | — <i>Cristagalli</i> | » 1-50 |
| — <i>macrostachya</i> | » 75 | — <i>trifoliata</i> | » 4 » | — <i>glandulosa</i> | » 1-50 |
| — <i>rubra</i> | » 1 » | — <i>vulgaris fol. purpur.</i> » | 75 | — <i>inermis</i> | » 1 » |
| — <i>atrosanguinea</i> | » 3 » | — <i>fol. variegata</i> | » 75 | — <i>latifolia</i> | » 1 » |
| Ailanthus glandulosa . . | 1-50 | Betula nana | » 1 » | — <i>oxyacantha fl. pl.</i> » | 1 » |
| Alnus laciniata | » 1 » | — <i>rotundifolia</i> | » 1 » | — — <i>rosea</i> | » 1 » |
| — <i>oxyacanthifolia</i> | » 1 » | Bignonia catalpa | » 1 » | — <i>punicea</i> | » 1-50 |
| — <i>sorbifolia</i> | » 1 » | (<i>Tecoma</i>) <i>grandiflora.</i> » | 5 » | — — <i>fl. pl.</i> | » 2 » |
| Amorpha fruticosa | » 50 | » <i>radicans</i> | » 1 » | — <i>pyracantha</i> | » 1 » |
| — <i>glabra</i> | » 50 | » — <i>flava</i> | » 2 » | Cryptomeria japonica. » | 50 |
| Amygdalis incana | » 3 » | Broussonnetia cucullata » | 1-50 | Cunninghamia sinens. » | 1-50 |
| — <i>nana</i> | » 50 | — <i>macrophylla</i> | » 1-50 | Cupressus disticha | » 75 |
| — <i>fl. pleno</i> | » 50 | — <i>papyrifera</i> | » 75 | — <i>pendula</i> | » 75 |
| — <i>persica fl. pl.</i> | » 1-50 | — <i>dissecta</i> | » 1 » | — <i>sempervirens</i> | » 50 |
| Andromeda acuminata » | 75 | Calycanthus floridus | » 50 | — <i>thuyoides</i> | » 1 » |
| — <i>angustifolia</i> | » 50 | — <i>præcox</i> | » 2 » | Cydonia sinensis. | » 1 » |
| — <i>axillaris</i> | » 50 | Carinocarpus lævigatus » | 5 » | — <i>japonica</i> | » 50 |
| — <i>calyculata</i> | » 50 | Castanea crispa | » 2 » | — — <i>alba</i> | » 50 |
| — <i>floribunda</i> | » 3 » | — <i>vesca. fol. argent.</i> » | 1 » | Cytisus Adami | » 1 » |
| — <i>lucida</i> | » 1 » | — — <i>aureis</i> | » 1 » | — <i>alpinus</i> | » 50 |
| — <i>mariana</i> | » 1 » | — <i>heterophylla</i> | » 1 » | — <i>austriacus</i> | » 1 » |
| — <i>nitida</i> | » 1 » | — <i>pumila</i> | » 1 » | — <i>bullatus</i> | » 1 » |
| — <i>paniculata</i> | » 50 | Ceanothus americanus » | 75 | — <i>falcatus</i> | » 1 » |
| — <i>polifolia</i> | » 75 | — <i>cœruleus</i> | » 2 » | — <i>Laburnum</i> | » 50 |
| — — <i>latifolia</i> | » 50 | — <i>divaricatus</i> | » 1 » | — <i>pendulus</i> | » 1-50 |
| — — <i>angustifolia.</i> » | 50 | — <i>intermedius</i> | » 2 » | — <i>nigricans</i> | » 1 » |
| — <i>pulverulenta</i> | » 50 | Cedrus Deodora | » 1 à 10 | — <i>odoratus</i> | » 1 » |
| — <i>racemosa</i> | » 75 | — <i>Libani</i> | » 1 à 2 | — <i>purpureus</i> | » 1 » |
| — <i>Walterii</i> | » 75 | Chionanthus virginica » | 2 » | — — <i>albiflor.</i> | » 1 » |
| Aralia hybrida | » 1 » | Cissus heteroph. fol. var. » | 75 | — <i>pendulus</i> | » 1 » |
| — <i>Japonica</i> | » 1 » | — <i>quinquefolia</i> | » 50 | — <i>quercifolius</i> | » 1 » |
| — <i>spinosa</i> | » 75 | Clematis cœrul. grandifl. » | 1 » | Cytisus sessilifolius. » | 1 » |
| Araucaria imbricata . . | 1-50 | — <i>bicolor</i> | » 1 » | Daphne alpina | » 75 |
| Aristolochia pubescens » | 75 | — <i>florida</i> | » 1 » | — <i>laureola</i> | » 50 |
| — <i>Sipho</i> | » 1-50 | — <i>florida fl. simp.</i> » | 2 » | — <i>mezereum</i> | » 50 |
| Atragene alpina. | » 1 » | — <i>flammula</i> | » 50 | — — <i>fol. atrop.</i> | » 2 » |
| — <i>indica</i> | » 1 » | — <i>Hendersonii</i> | » 1-50 | — — <i>fl. albo</i> | » 50 |
| Atragene simplex | » 2 » | — <i>montana</i> | » 50 | Deutzia canescens | » 1 » |
| Aucuba Japonia | » 1 » | — <i>viticella alba</i> | » 50 | — <i>gracilis</i> | » 1 » |
| — <i>latimaculata</i> | » 2 » | — <i>viticella plena</i> | » 1 » | — <i>scabra</i> | » 50 |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|---------|--|----------|---|---------|
| Eleagnus argentea | » 75 | Kalmia latifolia | 1 à 1-50 | Prunus Chamæcerasus | 2 » |
| — latifolia | 1-50 | Larix pendula | 1-50 | — Lauro-cerasus | » 50 |
| — pungens | 1 » | Leycesteria formosa | » 50 | — lusitânica | 1 » |
| Eriobotrya japonica | 2 » | — nepalensis | 1 » | — Mahaleb | 1 » |
| Evonymus americanus | 1 » | Ligustrum japonicum | 1 » | — nicotianæfolia | 1 » |
| — angustifolius | 1 » | Liquidambar imberbe | 1 » | — Padus aucubæfolia | 1 » |
| — japonicus | 1 » | Liriodendr. tulipifera 1 à 5 » | | — pumila | 1-50 |
| — latifolius | 1 » | — integrifolium | 2 » | — sempiflorens | 1-50 |
| — obovatus | 1 » | Lonicera alpigena | » 50 | Pyrus salicifolia | 1-50 |
| Fagus asplenifolia | 1 » | — balearica | » 50 | Quercus castanea | 1-50 |
| — cristata | 1 » | — caprifolium | » 50 | — cerris | 2 » |
| — pendula | 1-50 | — rubrum | » 50 | — fol. var. | 4 » |
| — purpurea | 1-50 | — canescens | » 50 | — coccinea | 1 » |
| — fol. var. | 1-50 | — cœrulea | » 50 | — imbricaria | 1-50 |
| Ficus carica | » 75 | — flexuosa | » 50 | — laciniata | 1 » |
| Forsythia viridissima | 2 » | — Ledebourii | » 50 | — cucullata | 1-50 |
| Fraxinus crispa | 1 » | — pubescens | » 50 | — palustris | 1 » |
| — heterophylla | 1 » | — sempervirens | » 50 | — pyramidalis | 1-50 |
| — juglandifolia | 1-50 | — tatarica | » 50 | — cucullata | 1-50 |
| — lenticifolia | 1-50 | — xylosteum | » 50 | — robur fol. var. | 1 » |
| — monophylla | 1-50 | Maclura aurantiaca | 2 » | — salicifolia | 1-50 |
| — ornus | 1-50 | Magnolia acuminata | 3 » | — sempervirens | 1 » |
| — pendula | 1 à 4 » | — Alexandrina | 3 » | — Tauza | 1 » |
| Garrya elliptica | 1 » | — cordata | 2 à 4 » | Rhododendron (Voir aux spécialités). | |
| — laurifolia | 3 » | — glauca | 1 » | Rhus cotinus | » 50 |
| Ginkgo biloba | 1 à 5 » | — grandiflora | 2 » | — typhina | » 50 |
| Gleditschia caspica | 2 » | — macrophylla | 5 à 10 » | Ribes albidum | » 75 |
| — horrida | 2 » | — maxima | 2 » | — echinatum | 1 » |
| — tricanthos | 1 » | — Norbertiana | 2 à 5 » | — Gordoniana | » 75 |
| Glycine brachybotrys | 2 » | — purpurea | 1 » | — punctatum | » 50 |
| — chinensis | 1 » | — Soulangiana | 3 » | — sanguineum | » 50 |
| Gymnocladus canadensis | 1 » | — speciosa | 3 » | — flore pleno | 1-50 |
| Halesia tetraptera | » 75 | — Thomsoniana | 3 » | — speciosum | » 75 |
| Ribiscus speciosus | 1 » | — triumphans | 1 » | Robinia bullata | 1 » |
| — syriacus | » 50 | — tripetala | 1 » | — inermis | 1 » |
| Hlex aquifol. alb. marg. | 1-50 | — Yulan | 3 » | — hispida | » 75 |
| — albo picta | 1-50 | Menziesia globularis | » 75 | — stricta | 1 » |
| — aurea marg. | 1-50 | Pallurus aculeatus | 1 » | — tortuosa | 1 » |
| — picta | 1-50 | Paulownia imperialis 1 à 5 » | | Rubus bellidiflorus | » 50 |
| — ferox | 1 » | Philadelphus Gordonii | » 75 | — corylifolius pleno | » 50 |
| — argentea | 1-50 | — gracilis | » 50 | — rotundifolius | 1 » |
| — aurea | 1-50 | — inodorus | » 50 | Sophora japonica | 1 » |
| — marginata | 1-50 | Pheonia serrulata | 1 » | — pendula | 3 » |
| — serratifolia | 1-50 | Picea balsamea | » 50 | Spiræa amœna | » 75 |
| — balearica | 1 » | — Webbiana | 3 » | — ariæfolia | » 60 |
| — cassine | 1-50 | Pinus australis | 2 » | — bella | » 50 |
| — opaca | 1-50 | — Cembro | 2 » | — canescens | » 50 |
| — Perado | 2 » | — Coulteri | 6 » | — corymbosa | » 50 |
| — latifolia | 1 à 5 » | — halepensis | 1 » | — Douglasii | » 50 |
| — myrtifolia | 1 » | — maritima | » 50 | — Lindleyana | » 75 |
| Juniperus communis | » 50 | — ponderosa | 1 » | — prunifolia plena | » 50 |
| — dumosus | 1-50 | — spendo-strobis | 2 » | — Reevesii | » 75 |
| — lycia | 1 » | — pinæa | » 75 | Taxus canadensis | 1-50 |
| — oxycedrus | 1 » | — strobis | » 50 | Thuya nepalensis | 2 » |
| — sabina | » 50 | — excelsa | 5 » | — occidentalis | » 75 |
| — tamariscifolia | » 50 | — sylvestris rubra | » 50 | — orientalis | » 75 |
| — fol. var. | » 50 | Populus acerifolia | 1 » | — articulata | 3 » |
| — thurifera | » 75 | — carolinensis | 1 » | Tilia argentea | 1 » |
| Kalmia angustifolia | » 75 | — dilatata | » 50 | — pendula | 2 » |
| — fol. var. | » 75 | — græca | 1 » | — Europeæa | » 75 |
| — lucida | » 75 | Prinos caroliniana | 1 » | — pendula | 1-50 |
| — media | » 75 | — glaber | 1 » | — laciniata | 1 » |
| — pumila | » 75 | Prunus avium pleno | 1-50 | Wegllea rosea | 1 à 2 » |
| — speciosa | » 75 | — cerasus fl. pl. | 1 » | | |
| — glauca | » 50 | — fol. var. | 1 » | | |



ROSIERS.

| | Fr. C. |
|---|--------|
| Bengales. Abbé de La- | |
| croix | » 75 |
| — A feuilles luisantes | » 75 |
| — A odeur d'Anis. | » 75 |
| — Aimé Plantier | 1 » |
| — Amiral de Rigny | » 75 |
| — Annette Gysels | » 75 |
| — Antoinette d'Orgot. | » 75 |
| — Archiduc Charles | » 75 |
| — Arence de Navaro | » 75 |
| — Arsinoé | » 75 |
| — Atropurpurea | » 75 |
| — Assuerus. | » 75 |
| — Augustine Hersant. | » 75 |
| — Baronne de Laage. | » 75 |
| — Beau carmin du | |
| Luxembourg | 1 » |
| — Belle de Monza. | » 75 |
| — Bolivard | » 75 |
| — Bouquet des Dames | » 75 |
| — Camellia (<i>Olyr</i>) | » 75 |
| — Carmin d'Yèvres | 1 » |
| — Charmante (la). | » 75 |
| — Comble de Gloire | » 75 |
| — Conquête heureuse | » 75 |
| — Cramoisi supérieur | » 75 |
| — Desfontaines | » 75 |
| — Duc de Bordeaux | » 75 |
| — Fanny Duval | » 75 |
| — Fénelon | » 75 |
| — Flore | » 75 |
| — Général Lowestine. | » 75 |
| — Gloire de Peley. | » 75 |
| — Gracilis | » 75 |
| — Grandidier | » 75 |
| — Henry V. | » 75 |
| — Hermite | » 75 |
| — Hippolyte | » 75 |
| — Icteros | 1 » |
| — Isidore (<i>d'Angers</i>) | » 75 |
| — Jean Marie | » 75 |
| — Jeune Arcole | » 75 |
| — Joséphine Malton | 1 » |
| — Julien Janin | » 75 |
| — Leonidas. | 1 » |
| — Louis-Philippe | |
| (<i>d'Angers</i>) | » 75 |
| — Madame Breon | 1 » |
| — Bureau | » 75 |
| — Desprez | 1 » |
| — Mars | » 75 |
| — Merveilleuse (la). | » 75 |
| — Miranda | » 75 |
| — Molière | » 75 |
| — Mont St. Bernard | » 75 |
| — Némésis | 1 » |
| — Pactoté (le). | 1 » |
| — Pluton | 1 » |
| — Régulière (la). | » 75 |
| — Reine de Lombardie | » 75 |
| — Roi des Belges | » 75 |
| — Saint-Samson | » 75 |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| Bengales. Superbe (la). | » 75 |
| — Taglioni | » 75 |
| — Tancrède | 1 » |
| — Triumphant. | » 75 |
| — Triumpe de Gand | » 75 |
| — Vésuve (le). | » 75 |
| — Victoire d'Aumy | » 75 |
| — Virginale | » 75 |
| — Virginie Lebon. | » 75 |
| — Zirko | » 75 |
| Hybr. remont. Renufe | |
| d'Osmond | 1 » |
| — Aricie | 1-25 |
| — Marie Dennisse. | 1-50 |
| — Cornet | 1 » |
| — Paul Levauneur | 1-25 |
| — Aubernon | 1-25 |
| — Arine | 1 » |
| — la superbe | 1 » |
| — indigo | 1-50 |
| — lady Alice Peel. | 1-25 |
| — Duc de Chartres | 1-25 |
| — Augustine Mou- | |
| chelet | 1-25 |
| — Mistriss Cripps. | 1-25 |
| — Palmire | 1 » |
| — Elise Mieliez | 1-25 |
| — Prudence Roeser | 1-25 |
| — Paul. de Neuilly | 1-25 |
| — Mélanie Cornu. | 1 » |
| — Mistriss Elliot | 1 » |
| — M ^{me} Breon | 1 » |
| — Com ^{te} Duchatel | 1-25 |
| — Louis Bonaparte | 1-25 |
| — maréchal Soult. | 1-25 |
| — reine de la Guil- | |
| lotière | 1-25 |
| — général Allard | 1-25 |
| — M ^{me} Defey | 1-25 |
| — Duchesse de Su- | |
| therland | 1-25 |
| — Princesse Hélène | 1-25 |
| — Duc d'Alencon. | 1-25 |
| — Duc d'Anmale | 1-25 |
| — Ebène | 1-25 |
| — la financière | 1-25 |
| — lady Fordwich | 1-25 |
| — Fulgone | 1-25 |
| — Comte d'Eu. | 1-25 |
| — Comte de Paris. | 1-25 |
| — Docteur Majolin | 1-25 |
| — Clément. Seringe | 1-25 |
| — Mad. Damene | 1 » |
| — Rivers | 1 » |
| — Prince Albert | 1 » |
| — Marquise Boccoli | 1-25 |
| — Baronne Prevost | 1-25 |
| Ile Bourbon de la Reine | 1 » |
| — Comice de Seine | |
| et Marne | 1-25 |
| — lady Canning | 1-25 |
| — Paul Joseph | 1-25 |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| Ile Bourbon Reine du | |
| matin | 1-50 |
| — Le Camée | 1-50 |
| — le maréchal du | |
| palais | 1-50 |
| — Phoenix | 1 » |
| — Abbé Plantier | 1 » |
| — Augustine Margat | 1 » |
| — Dupetit-Thouars | 1-50 |
| — Edouard Fossé. | 1-25 |
| — Deuil du duc | |
| d'Orléans | 1-50 |
| — géant des Batailles | 2 » |
| — général Hoche | 1 » |
| — Mad. Angéline | 1 » |
| — Timoteclé | 1-50 |
| — Reine des Iles | |
| Bourbon | 1-25 |
| — C ^{te} de Rambuteau | 1-25 |
| — gloire de Paris. | 1-25 |
| — belle Augustine | 1-25 |
| — Acidalia | 1-25 |
| — Prince Albert | 1 » |
| — Themis | 1-25 |
| — Mariane | 1-25 |
| — Reine des Vierges | 1-25 |
| — Celimène | 1-25 |
| — Augustine Le- | |
| lieure | 1-25 |
| — Mad. Neumann | 1-25 |
| — Labeydoyere | 1-25 |
| — Proserpine | 1-25 |
| — Lebrun | 1-25 |
| — pourpre fafait | 1-25 |
| — Mad. Souchet | 1-25 |
| — Thérèse Margat | 1-25 |
| — Premices des | |
| Charpennes | 3 » |
| — Rodille | 1-25 |
| — Docteur Blandin | 1-25 |
| — Charles Desprez | 1-25 |
| — Victoire argentée | 1-25 |
| — Faustine | 1-25 |
| — bouq. de Flore. | 1-25 |
| — Henry Plantier. | 1-25 |
| — Chaillot | 1-25 |
| — Hermosa | 1-25 |
| — gloire de Plant. | 1-25 |
| — d'Alger | 1-25 |
| — Candide Desprez | 1-25 |
| — Delphine | 1-25 |
| — Reine de Fontenay | 1-25 |
| — la Meldoise | 1-25 |
| — Lichas | 1-25 |
| — Hennequin | 1-25 |
| — George Cuvier | 1-25 |
| — Septantus | 1-25 |
| — Vicomte de Cussy | 1-25 |
| — Marie Dulan | 1-25 |
| — Dumont de Courset | 1-25 |
| — Pierre de St Cyr | 1-25 |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---------------------------------|--------|------------------------------|--------|---|--------|
| Mousseux carné. | 1 » | Provins aimable Hen- | | The ou indica Floralie | 75 |
| — Perpétuelle de Mau- | | riette | 1-25 | — Frédéric Weber . . . | 75 |
| — get | 1-50 | — Autrope | 1-25 | — Galathée | 75 |
| — Blanche | 1-50 | — Arethusa | 1-25 | — Général Vallée . . . | 75 |
| — Princesse Adélaïde. | 1-50 | — Agar | 1-25 | — Georges Sand . . . | 75 |
| — De la flèche | 1 » | — Bance | 1-25 | — Gigantesque | 75 |
| — Pourpre de Lafay . 1 » | | — Château de Namur. 1 » | | — Gombault | 75 |
| — Lancel | 1 » | — Catinat | 1-25 | — Grandidier | 75 |
| — Pourpre du Luxem- | | — Cuvier | 1-25 | — Grand sultan | 75 |
| — bourg | 1 » | — Fanny | 1-25 | — Ilamon | 75 |
| — Panaché pleine . . . | 1 » | — Frontenella | 1-25 | — Honneur de Flandre . | 75 |
| — Pompon feu | 1 » | — Hypatia | 1-25 | — Hyménée | 75 |
| — Picciola | 1 » | — Iphigenie | 1-25 | — Jacqueminot | 75 |
| — Oscar Foulard . . . | 1 » | — Lavoisier | 1-25 | — Jaune ancien | 75 |
| — Cœlina | 1 » | — Minos | 1-25 | — jeune Arcole | 75 |
| — Cocciné | 1 » | — Monime | 1-25 | — Jules Felice | 1 » |
| — Rose pâle | 1 » | — Rouget de Lille . . | 1-25 | — Julie Mansais | 1 » |
| Noisette à grande fleurs | | — Renoncule ponctué 1 » | | — Lavinie Dariul . . . | 75 |
| — pourpre | » 75 | — Stephanie Chevrier . | 1-25 | — Lutescens mutabil. . | 75 |
| — Anatole de Montes- | | — Tricolor de Flandre 1-25 | | — Feray | 75 |
| — quieu | » 75 | Thé ou Indica Adeline | » 75 | — Roussel | 1 » |
| — Antonine | 1 » | — Afranie | » 75 | — Madame de Rohan . . | 75 |
| — Angelina | 1 » | — Alexandre Richard . | » 75 | — Chavent | 75 |
| — Belle Marseillaise . | » 75 | — Anthérose | » 75 | — Magnus Ladulas . . . | 75 |
| — Blanche de Chatenay » 75 | | — Archinto | » 75 | — Mansais | 75 |
| — Camellia (rose) . . . | » 75 | — Archid. Thér. -Isab. » 75 | | — Marie de Médicis . . | 1 » |
| — Chromatella | 2 » | — Aurora | » 75 | — Mellesville | 75 |
| — Clara Wendel | 1 » | — Barbot | » 75 | — Moire | 1 » |
| — Clarisse Harlow . . . | » 75 | — Bardou | » 75 | — Morphée | 75 |
| — Comtesse Orloff . . . | » 75 | — Belle Allemande . . | » 75 | — Nisida | 75 |
| — Coronis | 1 » | — Mélanie | » 75 | — Nitida | 75 |
| — Désiré Roussel . . . | » 75 | — Bergman | » 75 | — Pauline Plantier . . . | 75 |
| — Desprez | » 75 | — Bon Silène | » 75 | — Pellonia | 75 |
| — Du Luxemb. (rose) . . | » 75 | — Bougère | » 75 | — Prince d'Esterhazy . . | 75 |
| — Elisa Lemaire | » 75 | — Bourbon | » 75 | — Princesse Hélène . . | 75 |
| — Eugénie Debouurg . . | » 75 | — Caroline | » 75 | — Reine de Golconde . . | 75 |
| — Fellemberg | » 75 | — Charles Raimbaud . . | » 75 | — Renommée (la) | 75 |
| — Fleur du jeune âge . . | » 75 | — Chrysocome | 1 » | — Rose du Luxemb. . . . | 75 |
| — Jeanne d'Arc | » 75 | — Clara Sylvain | » 75 | — Safrano | 75 |
| — Julie de Loynes . . . | 1 » | — Claudia Gourd | » 75 | — Silène | 75 |
| — Lamarque | » 75 | — Comte de Paris . . . | » 75 | — Smithi | 75 |
| — Lée | » 75 | — Delph. Gaudot | » 75 | — Souvenir du 50 mai . . | 75 |
| — Majestueuse | 1 » | — Desfontaines | » 75 | — de la Malmaison . . . | 75 |
| — Monstrueuse | 1 » | — Devoniensis | » 75 | — Strombio | 75 |
| — Pauline Henry | » 75 | — Duc de Grammont . . | » 75 | — Taglioni | 75 |
| — Pourpre de Tyr . . . | 1 » | — Duchesse de Lavall. » 75 | | — triump. de la Guill. 1 » | |
| — Solfatare | 1 » | — de Mecklemb. | » 75 | — du Luxembourg | 75 |
| — Stellina | 1 » | — d'Jèbles | » 75 | — Valentine | 75 |
| — Theobaldine | » 75 | — Elisa Mercœur | » 75 | — Venusta | 75 |
| — Zobéide | » 75 | — Eugène Hardy | » 75 | — Victoria | 75 |
| Provins panachées, mar- | | — Eugénie Desgaches . . | » 75 | — Walter Scott | 75 |
| brées et ponctuées. | | — Fafait | » 75 | Damas M^{me} Hardy . . . | 1 » |
| — Agamede | 1-25 | — Flavescens | » 75 | Pimpernelle Stanwell. 1 » | |

A mon choix.

| | |
|--------------------------------|--------|
| 25 Variétés Rosiers Bengales . | Fr. 12 |
| 25 — — Remontantes | » 18 |
| 25 — — Ile Bourbon | » 18 |
| 12 — — Mousseux | » 9 |
| 25 — — Noisettes | » 15 |
| 12 — — Provins panachées . . | » 9 |
| 25 — — Thés | » 12 |

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---|--------|
| Acanthus mollis. | » 50 | Anemone alpina | » 75 | Asarum canadense | 1-50 |
| Aceranthus diphyllus. . . | » 75 | — hepatica | » 50 | — japonicum | » 3 » |
| Achillea clavennæ | » 50 | — — cœrulea | » 50 | — virginicum | » 1 » |
| — eupatorium | » 50 | — — pleno | » 1 » | Asclepias incarnata | » 25 |
| — linguicula | » 50 | — — rubra | » 50 | — tuberosa | » 50 |
| — macrophylla | » 50 | — — pleno | » 50 | — — <i>la douzaine</i> | » 5 » |
| Aconitum album | » 50 | — — alba | » 50 | — nivea | » 25 |
| — automnale | » 10 » | — hortensis | » 50 | Asphodelus luteus | » 50 |
| — bicolor longiflorum . . . | » 2 » | — Hudsoniana | » 75 | — ramosus | » 50 |
| — Japonicum | » 50 | — Japonica | » 50 | — fistulosus | » 50 |
| — lycoctonum | » 50 | — lobata | » 1 » | Aster alpinus | » 25 |
| — laxiflorum | » 50 | — multifida | » 50 | — — albus | » 25 |
| — napellus | » 50 | — narcissiflora | » 1 » | — bicolor | » 50 |
| — ocreleucum | » 50 | — numerosa fl. pleno . . . | » 50 | — elegans | » 50 |
| — septentrionale | » 50 | — pulsatilla | » 25 | — ericoides | » 50 |
| — versicolor | » 50 | — ranunculoides | » 1 » | — novæ anglicæ | » 25 |
| Acorus gramineus fol. | | — palmata | » 1-50 | — Riversii | » 50 |
| — luteo marginatis | » 50 | — sylvestris | » 50 | — roseus | » 25 |
| Actæa spicata. | » 50 | — vernalis | » 75 | — Sibiricus | » 25 |
| Adenophora coronata. . . | » 75 | — vitifolia | » 1 » | Asterosephalus radiat. | » 50 |
| — latifolia | » 50 | Antennaria plantagin. . . | » 75 | Astragalus canariensis . . | » 50 |
| Adonis vernalis | » 50 | Anthericum liliago | » 50 | — Laxmannii | » 75 |
| Adiumia cirrhosa | » 50 | — liliastrum | » 50 | — maximus | » 1 » |
| Ægopodium podogra- | | — ramosum | » 50 | — nepalensis | » 1 » |
| — ria fol. var. . . . | » 50 | Anthirrium (V. plus | | — onobrychis | » 50 |
| Æthionema persicum | » 50 | — loin aux spécialités.) | | — versicolor | » 50 |
| Agrostemma coronaria . . . | » 50 | Anthyllis quadricolor . . . | » 75 | Astragalus carniolica . . | » 1 » |
| — fl. pleno | » 50 | Apios tuberosa | » 25 | — major | » 25 |
| — flos jovis | » 50 | Apocynum androsæmif. . . | » 50 | — — foliis aureis | » 3 » |
| — pyrenaicum | » 75 | Aquilegia canadensis . . . | » 50 | Auricules anglais avec | |
| Aira cœrulea | » 25 | — — major | » 50 | — noms, 1 ^{er} choix à | » 2 » |
| Ajuga genevensis | » 25 | — glandulosa | » 75 | — double jaune | » 75 |
| — — fl. rosea | » 25 | — — gigantea | » 2 » | — — noire | » 5 » |
| — reptans | » 25 | — — major | » 2 » | — tricolore | » 3 » |
| — — fol. varieg. . . . | » 50 | — Skinnerii | » 1 » | — ordinaires en mé- | |
| Alchemilla alpina | » 50 | — Siberica | » 50 | — lange, les 50 | » 8 » |
| Alyssum saxatile | » 50 | Arabis alpina | » 50 | Baptisia alba | » 1 » |
| — — fol. variegatis | » 50 | — lucida fol. varieg. . . . | » 1 » | — australis | » 50 |
| Allium molle | » 50 | — purpurea | » 50 | — exaltata | » 1 » |
| — azureum | » 1 » | — saxatillis | » 1 » | Barbarea vulg. fol. var. . . | » 50 |
| Alstrœmeria aurantiaca . . . | » 50 | Arenaria longifolia | » 50 | Bellium bellidioides | » 50 |
| — peregrina | » 50 | — montana | » 50 | — crassifolium | » 50 |
| — psittacina | » 50 | Aristolochia clematiles . . . | » 50 | Bellidiastrum Mitchelli . . | » 50 |
| — sulphurea tigrina | » 2 » | — rotunda | » 1 » | Betonica alba | » 50 |
| Amianthum muscæ- | | Armeria alpina alba | » 50 | — grandiflora | » 50 |
| — toxicum (<i>Helonias</i>) | » 5 » | — arborescens | » 50 | — superba | » 50 |
| Ammobium alatum | » 75 | Armeria formosa 50 c. à . . | » 1 » | Blumea longifolia | » 50 |
| Amaryllis formossis- | | — molinensis | » 75 | Bocconia cordata | » 50 |
| — sima, les 12 | » 3 » | — superba | » 1 » | Boltonia asteroides | » 50 |
| — belladonna | » 1 » | Arnica montana | » 50 | Borago oriental. (Nord- | |
| Amsonia latifolia | » 50 | Arum dracunculus | » 1 » | — mannia) | » 50 |
| Anemopsis californica . . . | » 1 » | — italicum | » 1 » | Bulbine barbata | » 1 » |
| Anemusa italica | » 50 | Arundo donax | » 1 » | Bupththalmum cordif. . . . | » 50 |
| Androsace balearica | » 50 | — — versicolor | » 2 » | — salicifolium | » 50 |
| Anemone apennina | » 50 | Arundinaria falcata, | | Calophanes oblongifol. . . | » 1 » |
| — coronaria | » 25 | — (bambou vivace) | » 5 » | Castilleja Lithospermoid. . . | » 2 » |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|-----------------------------------|--------|---|---------|-----------------------------------|--------|
| Caltha palustris . . . | » 50 | Cerastium tomentosum . . . | » 25 | Delphinium alpinum . . . | 1 » |
| Callopogon pulchella . . . | 1 » | Cephalanthera pallens . . . | 2 » | — Barlowii . . . | » 50 |
| Campanula azurea . . . | » 50 | Chelone barbata . . . | » 50 | — bicolor . . . | » 50 |
| — barbata . . . | 1-50 | — alba . . . | » 50 | — Curtesii . . . | » 50 |
| — bononiensis . . . | » 50 | — major . . . | » 75 | — cheilanthum . . . | » 50 |
| — carpathica . . . | » 50 | — centranthifolia . . . | 1 » | — Clusii . . . | » 75 |
| — alba . . . | » 50 | — glabra fl. albo . . . | » 75 | — elatum . . . | » 50 |
| — collina . . . | » 50 | — rubro . . . | » 50 | — compactum . . . | 5 » |
| — cordata . . . | 1 » | — Lyonii . . . | » 50 | — Fischerii . . . | » 50 |
| — fragilis . . . | » 75 | — Macrocana . . . | » 50 | — grandiflorum . . . | » 50 |
| — fragilis grandiflora . . . | 1 » | — obliqua . . . | » 50 | — hybridum . . . | » 75 |
| — garganica . . . | » 50 | — fl. alba . . . | » 75 | — intermedium . . . | » 50 |
| — grandis . . . | » 50 | — pubescens . . . | » 50 | — sinense grandis fl. | |
| — alba . . . | 1 » | Cheiranthus alpinus . . . | » 50 | — pleno . . . | 2 » |
| — grandiflora . . . | 1 » | Chrysanthemum (Voir les spécialités) . . . | | — hirsutum . . . | » 50 |
| — alba pleno . . . | 5 » | Chrysocoma linoxyris . . . | » 50 | — humile . . . | » 75 |
| — glomerata . . . | » 50 | Cineraria cordifolia . . . | » 50 | — sinense . . . | » 50 |
| — fl. albo . . . | » 50 | — macrophylla . . . | 2 » | — fl. album . . . | 1 » |
| — pleno . . . | 1 » | Circea alpina . . . | » 50 | — pallida pl. . . | 2 » |
| — Grosseckii . . . | 2 » | Cistus creticus . . . | » 75 | — triste . . . | 1 » |
| — laciniata . . . | 2 » | Claytonia Virginica . . . | 5 » | — urceolatum . . . | » 50 |
| — latifolia . . . | » 50 | Clematis azur. grandifl. . . . | 1 » | — villosum . . . | » 50 |
| — lætifolia . . . | 1-50 | — bicolor Sieboldii . . . | 1 » | Dianthus atrorubens . . . | » 50 |
| — lamifolia . . . | 1 » | — erecta . . . | » 50 | — alpinus . . . | » 50 |
| — Lamarckii . . . | » 50 | — integrifolia . . . | » 50 | — badinus . . . | » 75 |
| — lychnitis . . . | 1 » | — Hartwegii . . . | 2 » | — barbatus . . . | » 50 |
| — muralis . . . | » 50 | — tubulosa mongolica . . . | 1 » | — splendidissimus . . . | » 50 |
| — macrantha . . . | » 50 | — Hendersonii . . . | 1-50 | — collinus . . . | » 50 |
| — nitida alba (vera) . . . | 1 » | — Montana . . . | 1 » | — Goethalsii . . . | 1 » |
| — cœruleo . . . | » 75 | — glauca . . . | 3 » | — glacialis . . . | 1 » |
| — fl. pleno . . . | 1 » | — nepalensis . . . | 1-50 | — grandis . . . | 1 » |
| — nobilis . . . | » 50 | — odoratissima . . . | » 50 | — japonicus . . . | » 50 |
| — persicifolia fl. pl. . . | » 25 | — fl. pleno . . . | 1 » | — fol. variegatis . . . | 2 » |
| — fl. albo pleno . . . | » 50 | Cnicus Casabona . . . | » 75 | — Herbertii . . . | 1 » |
| — maxima . . . | » 25 | Comarum rubrum . . . | » 50 | — Highlerii . . . | 1 » |
| — pusilla fl. alba . . . | » 25 | Convallaria bifolia . . . | » 50 | — Napoleonii . . . | » 50 |
| — fl. cœruleo . . . | » 25 | — majalis fol. var. . . | » 50 | — reine des Pays-Bas . . . | 1 » |
| — punctata . . . | » 50 | — Sieboldii . . . | 1 » | — speciosissimus . . . | 1 » |
| — pyramidalis . . . | » 25 | Coreopsis integrifolia . . . | » 50 | Dicamnus albus . . . | » 50 |
| — fl. albo . . . | 1 » | — lanceolata . . . | » 50 | — rubra . . . | » 50 |
| — peregrina . . . | » 50 | — tripteris . . . | » 50 | Digitalis bicornuta . . . | » 50 |
| — rotundifolia . . . | » 50 | — tenuifolia . . . | » 50 | — Buxbaumii . . . | » 75 |
| — rubra . . . | 1 » | — verticillata . . . | » 50 | — eriophora . . . | » 50 |
| — rupestris . . . | 1 » | Coronilla bicolor . . . | » 50 | — ferruginea . . . | » 50 |
| — Scheuzerii . . . | » 50 | — glauca . . . | » 50 | — lutea . . . | » 25 |
| — speciosa . . . | » 50 | — variegata . . . | » 50 | — paniculata . . . | 1 » |
| — rhomboidea fl. pl. . . | 1 » | Cornus canadensis . . . | 1 » | Dodecatheon meadia . . . | » 50 |
| — thyrsiflora . . . | 1 » | Cortusa Mathioli . . . | 1 » | — alba . . . | 1 » |
| — trachelium . . . | » 50 | Corydalis capnoides . . . | » 50 | — gigantea . . . | 2 » |
| — fl. albo . . . | » 50 | — nobilis . . . | 1 » | — elegans . . . | 1 » |
| — uniflora . . . | » 50 | — spectabilis . . . | » 50 | — integrifolia . . . | 3 » |
| — urticæfolia . . . | » 50 | Crucianella stylosa . . . | » 50 | Doronicum scorpiodes . . . | » 50 |
| — alba pleno . . . | » 50 | Cyclamen Coum. . . . | 1 » | — pardalianches . . . | » 25 |
| Cardamine trifoliata . . . | » 50 | — europeum . . . | » 60 | — plantagineum . . . | » 25 |
| — pratensis fl. pleno . . . | » 50 | Cucubilla alpina . . . | » 50 | Draba aizoides . . . | » 50 |
| Carlina acaulis . . . | » 50 | Cynanchum Vincetoxic . . . | » 50 | — androsacea . . . | » 75 |
| Catananche cœrulea . . . | » 50 | — fol. variegatis . . . | » 50 | — pyrenaica . . . | 1 » |
| — bicolor . . . | » 50 | Cypripedium acaule 2 à 5 » | | Dracoceph. altaïense . . . | » 50 |
| Celista cretica . . . | » 75 | — calceolus . . . | » 60 | — arguense . . . | » 50 |
| Centaurea alba . . . | » 50 | — spectabiles . . . | 2 à 5 » | — austriacum . . . | » 50 |
| — montana . . . | » 50 | — pubescens . . . | 2-30 | — grandiflorum . . . | » 50 |
| — nigrescens . . . | » 50 | Delphinium azureum . . . | » 50 | — Louisianum . . . | » 25 |
| Centranthus ruber . . . | » 50 | — aconitif. fl. pleno . . . | » 50 | — Ruyschianum . . . | » 50 |
| — fl. albo . . . | » 50 | | | — speciosum . . . | » 50 |
| — fl. rosea . . . | » 50 | | | | |



| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Dracoceph. superbum . . . | 50 | Gaillardia aristata . . . | 25 | Gypsophila saxi fraga . . | 50 |
| — virginicum . . . | 50 | — grandiflora . . . | 50 | — saligna . . . | 25 |
| Dryas octopetala . . . | 50 | — bicolor . . . | 50 | Hedysarum obscurum . . | 75 |
| Eceremocarpos scaber . . | 50 | — elegantissima . . . | 1 | — tauricum . . . | 25 |
| Echinops Rithro . . . | 50 | — maxima . . . | 1 | Helianthus mollis . . . | 50 |
| — sparocephalis . . . | 50 | — picta coccinea . . . | 50 | — altissimus . . . | 50 |
| Echinacea Americana . . | 1 | — Richardsonii . . . | 50 | Helium californicum . . | 50 |
| Epilobium angustifol. . . | 50 | — splendida . . . | 2 | Helianthemum 12 bel- | |
| — spicatum . . . | 50 | — Wellsiana . . . | 75 | les variétés pour . . . | 5 |
| Epimedium alpinum . . . | 25 | Galax aphylla . . . | 75 | Helleborus hyemalis . . | 50 |
| — bifolium . . . | 50 | Galatella hyssopifolia . . | 50 | — trifoliat . . . | 1 |
| — colchicum . . . | 3 | — linifolia . . . | 50 | — niger . . . | 50 |
| — erectum . . . | 75 | Galega orientalis . . . | 25 | — pallidus . . . | 1 |
| — grandiflorum . . . | 50 | — persica . . . | 50 | — purpurea . . . | 1 |
| — Musschianum . . . | 75 | Gallanthus nivalis fl. . | | — viridus . . . | 1 |
| — pinnatum . . . | 2 | — pleno . . . | 75 | Helonias asphodeloides . | 5 |
| — violaceum . . . | 50 | Galeobdolon luteum . . . | 50 | — bullata . . . | 1 |
| Eranthis hyemalis . . . | 50 | Gardoa betonicoides . . . | 50 | — dioica . . . | 5 |
| Erigeron alpinus . . . | 50 | Genista sagittalis . . . | 50 | — glaberrima . . . | 5 |
| — fl. albo . . . | 50 | — tinctoria fl. pleno . . | 1 | — lata . . . | 5 |
| — glabellus . . . | 50 | Gentiana acaulis . . . | 25 | Hemerocallis fulvostr. . | 50 |
| — grandiflorus . . . | 75 | — la douzaine . . . | 2 | — rutillans . . . | 50 |
| — speciosus . . . | 50 | — asclepiadea . . . | 1 | — speciosa . . . | 1 |
| Erinus alpinus . . . | 50 | — major . . . | 1 | Hesperis matronalis . . | 50 |
| Erpetium reniforme . . . | 50 | — fl. albo . . . | 1 | — grandifl. pleno . . . | 50 |
| Eryngium alpinum . . . | 75 | — bavarica . . . | 2 | Heterotropa asaroides . | 5 |
| — bromelifolium . . . | 1-50 | — catesbæi . . . | 2 | Hieracium aurantiac. . . | 50 |
| — giganteum . . . | 75 | — cruciata . . . | 50 | — Jacquini . . . | 50 |
| — maritimum . . . | 1 | — hybrida . . . | 2 | — villosum . . . | 50 |
| — planum . . . | 25 | — lutea . . . | 1 | Homogyne alpina . . . | 50 |
| Erythronium améric. . . | 2 | — macrophylla . . . | 1-50 | Horminum pyrenaic. . . | 75 |
| — denscanis albiflor. . . | 25 | — ochroleuca . . . | 50 | Hoteja japonica . . . | 50 |
| — — purpureum . . . | 25 | — pneumonanthe . . . | 50 | Houstonia cerulea . . . | 50 |
| — — roseum . . . | 25 | — alba . . . | 5 | Hyoscyamus physaloid. . | 50 |
| — — lanceolatum . . . | 2-50 | — purpurea . . . | 5 | Hypericum calycinum . . | 50 |
| Erythrolæna conspicua . | 1-50 | — punctata . . . | 2 | — nepalensis . . . | 75 |
| Erythraea pulchella . . . | 75 | — saponaria . . . | 50 | Hydrophyllum canad. . | 50 |
| Eupatorium ageratoid. . . | 50 | — fl. albo . . . | 2 | Hyacinthus comusus . . | 50 |
| — purpureum . . . | 75 | — septenifida . . . | 2 | — monstrosus . . . | 50 |
| Euphorbia dulcis . . . | 25 | — Thomasii . . . | 5 | Iberis carnosa . . . | 75 |
| — fol. variegatis . . . | 50 | — verna . . . | 50 | — foliis variegatis . . . | 50 |
| — Esula . . . | 25 | Geranium Andrewsii . . | 50 | Inula glandulosa . . . | 50 |
| Fragaria indica . . . | 25 | — ibericum . . . | 50 | — hirta . . . | 50 |
| — monophylla . . . | 25 | — macrorrhizum . . . | 50 | — salicina . . . | 50 |
| — pentaphylla . . . | 75 | — pratense fl. pleno . . | 50 | — squarrosa . . . | 50 |
| — vesca fol. var. . . | 50 | — striatum . . . | 50 | Iris , une collection de . . | |
| Francoa sonchifolia . . . | 50 | Geum coccineum . . . | 50 | 40 nouvelles va- | |
| Fritillaria imperialis . . | 50 | — fulgens . . . | 50 | riétés nommées, | |
| — fol. variegatis . . . | 1 | — grandiflorum . . . | 50 | pièce . . . | 50 |
| — meleagris . . . | 50 | — montanum . . . | 50 | Jasione perennis . . . | 50 |
| Funkia cordifolia . . . | 50 | — rivale . . . | 50 | Lactuca perennis . . . | 50 |
| — alba . . . | 75 | — sanguineum . . . | 50 | Lathyrus grandiflorus . . | 50 |
| — cucullata . . . | 75 | — trifoliatum . . . | 50 | — californicus . . . | 1 |
| — à feuilles bordées . . | | Gladiolus (V. plus loin). . | | — latifolius . . . | 25 |
| de blanc . . . | 1 | Glaux maritima . . . | 50 | — albus . . . | 50 |
| — à feuil. jaunes . . . | | Glecoma heder. fol. var. . | 50 | — punctatus . . . | 1 |
| bordées de vert . . . | 1 | Globularia nudicaulis . . | 50 | — rotundifolius . . . | 2 |
| — grandiflora . . . | 2 | — vulgaris . . . | 50 | — sanguineus . . . | 1 |
| — Japonica . . . | 50 | Glycine apios . . . | 25 | — Turnerii . . . | 1 |
| — lancæfolia . . . | 25 | Gnaphallium diocium . . | 50 | — tuberosa . . . | 25 |
| — alba . . . | 1 | Goodyera repens . . . | 1 | Lanum rugosum . . . | 50 |
| — à feuilles bordées . . | | Gunnera scabra fort . . | 5 | — Horsfalliæ . . . | 50 |
| de blanc . . . | 50 | Gypsophila perfoliata . . | 75 | Lapsania nudiflora . . . | 50 |
| — undulata fol. aureis . | 1 | — scorzonæefolia . . . | 25 | Leimanthium virgin. . . | 5 |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|----------|---|--------|---|--------|
| Liatris pumila | 1 » | Lobelia bellidifolia | 50 | — atroseus | 50 |
| — spicata | 1 » | — cardinalis | 50 | — Griseldis | 50 |
| — squarosa | 1 » | — Cavanillesii | 50 | — Harrissonii | 50 |
| — pycnostachia | 1 » | — cœruleo | 50 | — splendens | 50 |
| Linaria Dalmatia | 50 | — grandiflora | 50 | — vulcan | 50 |
| — Pissis | 75 | — dracocephaloides | 50 | Mitchella repens | 50 |
| — purpurea | 50 | — erinus | 50 | Monarda alba | 25 |
| — speculum album | 50 | — eximia | 50 | — didyma | 25 |
| — tricolor | 50 | — exoniensis | 1 » | — fistulosa | 25 |
| — triornitophora | 50 | — fulgens | 50 | — purpurea | 25 |
| — triste | 50 | — multiflora | 1-50 | — Russelliana fl. alba | 25 |
| Lilium atrosanguineum | 1 » | — pyramidalis | 1 » | Moraea chinensis | 50 |
| — — vulcan | | — ignea | 75 | Morina longifolia | 2 » |
| — — Voltaire | | — heterophylla major | 1 » | Napea scabra | 50 |
| — — Napoléon | | — Limburgensis | 1 » | Narcissus bulbosus | 50 |
| — — Wellington | à 2 » | — longifolia | 1 » | Narthecium ossifragum | 75 |
| — — Japho | | — Millerii | 50 | Nordmannia cordata | 50 |
| — — Claude | | — præcox | 2 » | Nuttallia grandiflora | 3 » |
| — aurantiacum (Thun- | | — sanguinea vera | 1 » | — malvæfolia | 50 |
| — bergianum) | 1 » | — syphilitica | 25 | Œillets , 1 ^{er} ordre avec | |
| — Broussartii (Lanc. | | — alba | 1 » | noms, la collec- | |
| — album) | 1 à 2 » | — tupa coccinea | 1 » | tion de 50 varié- | |
| — Brownii | 5 à 15 » | — — atrosanguinea | 2 » | tés pour | 40 » |
| — bulbiferum | 40 » | — topaz | 1 » | Œnothera ambigua | 50 |
| — — foliis arg. m. 1 à 5 » | | — unidentata | 50 | — Drummondii | 50 |
| — canadense | 2 » | — violacea | 1 » | — fruticosa | 50 |
| — — rubrum | 1-50 | — Vilmoreana | 1 » | — fol. var. | 50 |
| — candidum | 25 | — vulcan | 1 » | — Lamarkiana | 50 |
| — — foliis marmor | 3 » | Lotus corniculatus plena | 50 | — macrocarpa | 75 |
| — — fl. pleno | 40 » | Lupinus 6 belles var. à | 50 | — nocturna | 75 |
| — — sanguinea | 60 | Lychnis alpina | 50 | — pumila | 25 |
| — — fol. varieg. arg. | 50 | — amœna fl. pleno | 75 | — speciosa | 50 |
| — Carolinianum | 5 » | — Bungeana | 75 | — taraxicifolia | 50 |
| — chalcœdonicum | 50 | — chalcœdonica | 25 | Œnoclea sensibilis | 1 » |
| — — en beau mél., | | — — fl. pleno | 50 | Œnonis natrix | 50 |
| le cent | 20 » | — — fl. albo | 50 | — fruticosa | 50 |
| — concolor | 1 » | — — — pleno | 75 | — rotundifolia | 50 |
| — croceum | 25 | — — nana fl. rub. pl. | 1-50 | Œnosma taurica | 75 |
| — — foliis variegatis | 3 » | — coronata | 50 | Orobis albus | 50 |
| — — umbellatum | 2 » | — dioica fl. albo pleno | 1 » | — fl. pleno | 2 » |
| — excelsum (testaceum) | 2 » | — — fl. roseo pleno | 50 | — angustifolium | 75 |
| — eximeum | 2 » | — — fl. rubro pleno | 25 | — alpestris | 75 |
| — Japonicum | 5 à 15 » | — — flosculifl. albo pl. | 25 | — aureus | 1 » |
| — lancifol. album | 1 à 2 » | — — fl. rubro plena | 25 | — atropurpureus | 1 » |
| — — roseum | 1 à 3 » | — — flosjovis | 50 | — digitalis | 1 » |
| — — rubrum | 2 » | — fulgens | 50 | — filiformis | 1 » |
| — — punctatum | 5 à 6 » | — fortunei | 50 | — lacteus | 1 » |
| — longiflorum les 12 | 2 » | — viscaria fl. albo pl. | 50 | — lathyroides | 1 » |
| — martagon en 15 va- | | — — fl. rubro pleno | 50 | — Merghelyneckii | 1 » |
| riétés, les 25 | 8 » | Lysimachia punctata | 50 | — niger | 50 |
| — pyramidale | 50 | — — thyrsoflora | 1 » | — purpureus | 1 » |
| — pyrenaicum | 50 | — ciliata | 1-50 | — Smouthii | 75 |
| — superbum | 50 | Lythrum alatum | 50 | — silvestris | 1 » |
| — tigrinum | 50 | — roseum superbum | 50 | — vernus | 50 |
| Linnaea borealis | 50 | Malva campanulata | 1-50 | — — azureus | 2 » |
| Linum grandifl. album | 1 » | — — Creeana | 50 | — — roseus | 1 » |
| — flavum | 50 | — — lateritia | 50 | — — speciosus | 1 » |
| — alpinum | 1 » | Matricaria parthenioid. | 50 | — versicolor | 75 |
| — monogynum | 75 | Megasea ciliata fl. albo | 75 | — — lutescens | 1 » |
| — perenne | 50 | Melissa grandiflora | 50 | Paschysandra procumb. | 75 |
| Lippia filiformis | 50 | Melittis mellissophylla | 50 | Pœonia albiflora | 50 |
| Lobelia aurantiaca | 1 » | Mentha piperita foliis | | — — alba patens | 2 » |
| — azurea | 50 | — variegata | 25 | — — rubrocincta | 4 » |
| — Althentoweriensis | 1 » | Mimulus alatus | 50 | — — amabil. grandifl. | 3 » |

| Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. | |
|------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Pæonia albiflora amab. | | Parnassia asarifolia . . . | 1 » | Potentilla nepalensis . . . | » 75 |
| — speciosa | 4 » | — palustris | » 50 | — Oliveriana | » 1 » |
| — — anemoneff. str. | 2 » | Pensées, 100 belles va- | | — Oswaldiana | » 1 » |
| — — bicolor | 3 » | riètes, 1^{re} qual. à | » 50 | — Pensylvanica | » 50 |
| — — Buyckii | 3 » | Pentaphyll. Lupinaster | » 50 | — Russelliana | » 25 |
| — — claptensis | 2 » | Penstemon argutus . . . | » 50 | — sulphurea | » 50 |
| — — Duch. de Nem. . . | 4 » | — angustifolius | » 50 | — Siberica | » 50 |
| — — elegans | 2 » | — amplexicaulis | » 50 | — tormentilla tonquin . . | » 50 |
| — — elegantissima . . . | 4 » | — campanulatus | » 50 | — Thomasii | » 75 |
| — — festiva | 3 » | — cobæa | 2 » | Primula auricula . . . | » 50 |
| — — formosa | 3 » | — crasifolius | » 50 | — — var. <i>anglaises</i> | |
| — — globosa amæn. . . | 4 » | — diffusus | » 50 | — — avec noms, 1 ^{er} | |
| — — grandif. niv. pl. . | 4 » | — Digitalis | » 50 | — — choix, à | 2 » |
| — — Hericartiana . . . | 3 » | — Gentianoides | » 50 | — — var. <i>ordin. en</i> | |
| — — lilacina pleniss. . | 5 » | — — albus | 1 » | — — mélange, les 50 . . | 8 » |
| — — — superba | 3 » | — — coccineus | » 50 | — — à fl. doub. jaune . . | » 75 |
| — — — elegans | 3 » | — — splendens | » 50 | — — — noire | » 5 |
| — — Lowii | 5 » | — — Mac Evenii | » 75 | — — Cortusoides | » 50 |
| — — lutescens alba . . . | 4 » | — glandulosus | » 75 | — — Calycina | 1-50 |
| — — lutea | 5 » | — glaucus | » 50 | — — denticulata | » 1 » |
| — — nivalis (<i>Buyck</i>) . . | 3 » | — gracilis | » 50 | — — farinosa | » 50 |
| — — odorata (<i>Lemon</i>) . | 3 » | — latifolius | » 75 | — — alba | » 1 » |
| — — odoratissima . . . | 4 » | — Mackayanus | » 50 | — — helvetica | » 1 » |
| — — papaveriflora . . . | 5 » | — mexicanus | » 1 » | — — integrifolia | » 1 » |
| — — plenissima ros. | | — Murrayanus | 2 » | — — longifolia | » 1 » |
| — — — superba | 3 » | — ovatus | » 50 | — — marginata | » 1 » |
| — — — variegata . . . | 3 » | — procerus | » 50 | — — minima | » 1 » |
| — — — Potsii | 1 » | — pubescens | » 50 | — — multiflora | » 1 » |
| — — — prolifera tricol. . | 5 » | — Richardsonii | » 50 | — — nivalis | » 50 |
| — — — pulcherrima . . . | 3 » | — speciosus | 2 » | — — cœruleo | » 50 |
| — — — Queen's perfect. . | 3 » | — striatiflorus | » 50 | — — Palinuri | » 1 » |
| — — — Victoria | 3 » | — suffructicosus | » 50 | — — pedemontana | » 50 |
| — — — Reevesii | 1 » | — Scouleri | » 1 » | — — scotica | » 1 » |
| — — — reine des roses. . | 3 » | Phlomis alpina | » 50 | — — speciosa | » 1 » |
| — — — rosa alba | 3 » | — iberica | » 50 | — — veris alba pleno . . | » 50 |
| — — — rosea triumph. | | — simia | » 50 | — — azurea fl. simpl. . . | » 75 |
| — — — odorata | 6 » | Plox (v. aux spécialités). | | — — atropurpurea | » 75 |
| — — — rosea speciosa. . | 6 » | Physiostegia imbricata | » 50 | — — bicolor pleno . . . | » 50 |
| — — — — amabilis | 4 » | Phyteuma canescens . . | 1 » | — — candidissima pl. . | 2-50 |
| — — — — aurea | 4 » | — orbiculare | » 50 | — — carnea pleno . . . | » 1 » |
| — — — rub. ros. cincta . | 4 » | — spicatum | 1 » | — — Derasseana plena . | 1-50 |
| — — — rubicunda albo | | Pinguicula alpina . . . | 3 » | — — fulgens pleno . . . | » 50 |
| — — — marginata | 2 » | Plantago lanceolata fol. | | — — lilacina pleno . . . | » 25 |
| — — — rubesc. amabil. . | 2 » | — variegata | » 50 | — — lutea pleno | » 50 |
| — — — rosea dilecta . . . | 4 » | Podophyllum peltatum | » 75 | — — maidenblush | » 1 » |
| — — — sulphurea | 3 » | Polemonium cœruleum | » 25 | — — marginata pleno . . | » 1 » |
| — — — — rosca | 5 » | — — album pleno | » 25 | — — multicol. pleno . . | » 50 |
| — — — tricolor flavesc. . | 6 » | — — reptans | » 25 | — — nigra pleno | » 75 |
| — — — ros. lilacina . . . | 4 » | — — Richardsonii | » 50 | — — rubra pleno | » 50 |
| — — — extra | 8 » | Polygala chamæbuxus. | » 25 | — — Turnholtiana | » 1 » |
| — — — var. plenissima. . | 4 » | Potentilla Americana . | 1-50 | — — Yellow (<i>Delache</i>) . . | » 50 |
| — — — versic. (<i>Buyck</i>) . . | 6 » | — alpina | » 50 | — — tricolor | » 1 » |
| — — — victoria tricolor . | 5 » | — argentea | » 50 | — — — de Gand | » 75 |
| — — — anomale | 1 » | — atrebatensis | » 50 | Prunella alba | » 50 |
| — — — daurica fl. pleno . | 2 » | — atosanguinea | » 50 | — — grandiflora | » 50 |
| — — — edulis alba | » 50 | — aurantiaca | » 50 | Pulmonaria alpina. | » 1 » |
| — — — fragrans | » 50 | — Cravenii | 1-50 | — — davurica | » 1 » |
| — — — Fischerii | 3 » | — confertiflora | 1 » | — — maritima | 1-50 |
| — — — tenuifolia | » 25 | — eximea | 1-50 | — — Montana | » 50 |
| — — — rubro pleno . . . | 4 » | — formosa | » 50 | — — officialis fl. albo . . | » 50 |
| — — — Wittmanniana . . . | 25 » | — Hopwoodiana | » 50 | — — pendula | » 75 |
| Papaver bracteata . . . | » 50 | — lineata | » 75 | — — virginica | » 50 |
| — — splendidissima . . . | » 50 | — multifida | 1 » | Pyrola rotundifolia . . | » 50 |
| | | — magna | 2 » | — — secunda | » 50 |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Ramonda pyrenaica . . . | 1 » | Silene alpestris . . . | » 50 | — speciosa . . . | » 50 |
| Ranunculus alpestris . . . | » 50 | — acaulis . . . | » 50 | — tuberosum . . . | » 50 |
| — aconitifolius . . . | » 50 | — chloræfolia . . . | » 50 | Thermopsis fabacea . . . | 1 » |
| — gramineus . . . | » 50 | — compacta . . . | » 50 | — laburnifolia . . . | » 75 |
| — hybridus . . . | » 50 | — grandifl. fl. pleno . . . | » 75 | Tiarella cordata . . . | 1 » |
| — plantanifolius . . . | 2 » | — incarnata . . . | 1 » | Tradescantia rosea . . . | » 50 |
| — repens fol. var. . . | » 50 | — laciniata . . . | 2 » | — splendens . . . | » 50 |
| Renoncles en tr. beau | | — Schafta . . . | 1 » | — virginica alba . . . | » 50 |
| <i>mélange, le cent.</i> . . . | 6 » | — maritima fl. alb. pl. . . | » 50 | — rubra pleno . . . | » 50 |
| Renealmia grandiflora . . . | 1 » | — Orientalis . . . | » 50 | Trifolium repens . . . | » 50 |
| Rhexia virginica . . . | 1 » | — regia . . . | 2 » | Trillium erectum . . . | » 5 |
| Rudbeckia Drummondii . . . | 1 » | Silphium laciniatum . . . | 1 » | — grandiflorum . . . | 1 » |
| — hirta . . . | » 50 | Sisyrinchium anceps . . . | » 50 | — pictum . . . | » 5 |
| — laciniata . . . | » 50 | — grandiflorum . . . | » 50 | Trollius asiaticus . . . | » 50 |
| — purpurea . . . | 1 » | — mucronatum . . . | » 50 | — aconitifolius . . . | » 50 |
| — triloba . . . | 1 » | Solanum dulcamara fol. | | — atrebatensis . . . | 1 » |
| Salvia angustifolia . . . | » 50 | argenteis . . . | » 50 | — Europæus . . . | » 50 |
| — sinensis . . . | 1 » | — fol. aureis . . . | » 50 | — major . . . | 1 » |
| Samolus littoralis . . . | » 50 | Soldanella alpina . . . | » 50 | — hybridus . . . | 1 » |
| Sanguinaria canadensis . . . | » 50 | — Clusii . . . | » 75 | — medius . . . | 1 » |
| Saponaria ocymoides . . . | » 50 | — crenata . . . | » 50 | Tussillago alpina . . . | » 25 |
| — officinalis purp. pl. . . | » 50 | — minima . . . | 1 » | — Japonica . . . | 2 » |
| Sansurea alpina . . . | » 75 | — montana . . . | » 50 | Uvularia grandiflora . . . | 2 » |
| Saxifraga aizoides . . . | » 75 | Sophora alba . . . | 1 » | Valeriana grandiflora . . . | 2 » |
| — aizoon . . . | » 50 | — australis . . . | » 50 | — montana . . . | » 50 |
| — ceratophylla . . . | » 50 | Spigelia marylandica . . . | 1 » | — pyrenaica . . . | » 75 |
| — crassifolia . . . | » 50 | Spirea aruncus . . . | » 50 | Veratrum album . . . | » 75 |
| — cordifolia . . . | » 75 | — argentea . . . | » 50 | — nigrum . . . | » 75 |
| — ligulata alba . . . | » 75 | — filipendula . . . | » 50 | Verbascum ferrugineum . . . | » 75 |
| — pedata . . . | » 50 | — Japonica . . . | » 50 | — Myconi . . . | 1-50 |
| — retusa . . . | 1 » | — lobata . . . | » 50 | — nigrum . . . | » 50 |
| Scabiosa amœna . . . | 1 » | — trifoliata . . . | » 50 | — purpureum . . . | » 50 |
| — caucassica . . . | » 75 | — ulmaria fl. pleno . . . | » 50 | Verbena venosa . . . | » 50 |
| — sambucifolia . . . | » 75 | — fol. var. . . | » 50 | Veronica alpina . . . | » 75 |
| Scilla amœna . . . | » 50 | — venusta . . . | » 50 | — australis . . . | » 50 |
| — rosea . . . | » 50 | Stachys coccinea . . . | » 50 | — chamædrys . . . | » 50 |
| — præcox . . . | » 50 | — speciosa . . . | » 50 | — fol. eleg. varieg. . . | » 50 |
| Scutellaria alpina . . . | » 75 | Statice Besseriana . . . | 2 » | — gentianoides . . . | » 25 |
| — columnæa . . . | » 75 | — bellidifolia . . . | » 75 | — glauca . . . | » 50 |
| — Japonica . . . | » 50 | — cordata . . . | 1 » | — gracilis . . . | » 50 |
| — macrantha . . . | 2 » | — cordifolia . . . | 1 » | — monstrosa . . . | » 75 |
| — splendens . . . | 1 » | — Fortunei . . . | 4 » | — saxatilis . . . | 1 » |
| Sedum cristatum . . . | » 50 | — Gmelini . . . | 1 » | — spicata . . . | » 25 |
| — glabiferum . . . | » 75 | — incana <i>en variét. à</i> . . . | 1 » | — fol. aureis . . . | » 50 |
| — involucratum . . . | » 50 | — latifolia . . . | » 50 | — Waldsteiniana . . . | » 50 |
| — maximum fol. var. . . | » 50 | — limonium . . . | » 50 | Vinea minor fol. varieg. . . . | » 25 |
| — purpureum . . . | » 75 | — eximea . . . | 2 » | Viola arborescens pleno . . . | » 25 |
| — populifolium . . . | » 75 | — molinensis . . . | 1 » | — calcarata . . . | » 50 |
| — sempervivoides . . . | » 75 | — pseudo-armeria . . . | » 50 | — cornuta . . . | » 50 |
| — Sieboldii . . . | » 50 | — puberula . . . | 1-50 | — montana . . . | » 50 |
| — Riversii . . . | » 75 | — sinuata . . . | 2 » | — palmata . . . | » 50 |
| — tephium . . . | » 25 | — speciosa . . . | 2 » | — striatiflora . . . | » 50 |
| Semperviv. globulifer. . . . | » 75 | — spathulata . . . | 1 » | — altaica, 100 <i>variét.</i> | |
| Senecio abrotanifolius . . . | » 50 | — tatarica . . . | » 50 | <i>pièce à.</i> . . . | » 50 |
| — Doria . . . | » 75 | Stenactis speciosa . . . | » 50 | Wulfenia carinthiaca . . . | » 50 |
| Serratula alata . . . | » 50 | Stipa pennata . . . | » 75 | Xerophyllum asphode- | |
| — coronata . . . | » 50 | Swertia perennis . . . | » 75 | <i>lodes</i> . . . | 4 » |
| — heterophylla . . . | » 50 | Symphytum coccineum . . . | » 50 | Yucca flaccida . . . | 4 » |
| — ochroleuca . . . | » 50 | — tuberosum . . . | » 50 | — glaucescens . . . | 4 » |
| — nigrescens . . . | » 75 | Tenacium chamædrys . . . | » 50 | — gloriosa . . . | 1-50 |
| Sida malvæflora . . . | » 50 | Thalictrum alpinum . . . | 1 » | Zigadenus glaberrimus . . . | 5 » |



DIVERSES ARTICLES DE PLEINE TERRE.

ANTHIRRINUM.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------|--------|
| A feuilles bordées de blanc | » 50 | Decorum | » 50 | Striatum formosissimum | 1 » |
| Amabile. | » 50 | Enchantress | 1 » | — superbum | » 50 |
| Atrostriatum maculatum | » 50 | Jaune pur | 1 » | Sulphureum punctatum | 1 » |
| Belle rubannée. | 1-50 | Jupiter | » 50 | — roseum | » 50 |
| Bicolor roseum | » 50 | Leverriis | 1 » | Tricolor | 1 » |
| Blanc à fleurs doubles | » 50 | Magnet | » 50 | Triumphans | 1 » |
| — pur sablé de blanc | | Magniflorum | 1 » | Venosum | » 50 |
| gorge jaune | 1 » | Marginatum | 1 » | Washington | » 50 |
| Caryophyllæflorum | » 50 | Roseo album | » 50 | Youngianum | » 50 |
| Darius | 1 » | Rouge à fleurs doubles | » 50 | | |

CHRYSANTHEMUM.

Variétés à 75 centimes pièce.

| | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Ayde. | Pomponiflora. | Emilie Lebois. |
| Dalila. | Silène. | Fabius. |
| Emilie Tessier. | Temple de Salomon. | Général Marceau. |
| Enrichetta modesta. | Zoé. | La Fontaine. |
| Général Rochambeau. } | | Lanjuinais. |
| Hecuba. | Nouveautés de 1848, à | Matricorioides. |
| Junon. | 1 fr. 50 cent. pièce. | Nazard. |
| King of Crimson. | Armand Tessier. | Phoenix. |
| La calebasse. | Aspasie. | Pygmalion. |
| La Camargo. | Barbette. | Pompon d'or. |
| La Gorgone. | Brinda. | Reine des Belges. |
| La salamandre. | Briska. | Rigolette. |
| Le vampire. | Cælina Tessier. | |
| Picciola. | Camille Himm. | <i>Les anciennes variétés à 25</i> |
| Pierette. | Christine. | <i>centimes pièce.</i> |
| Pluton. | | |

PHLOX.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Actif. | 2 » | Belle Reine | » 75 | Drummondii | » 50 |
| Arsinol | » 75 | Bella | » 50 | Dulcis nova. | 1 » |
| Alba magniflora | » 75 | Cerealis | » 75 | Eclipse | » 75 |
| Amica | » 50 | Carnea nova | » 75 | Egyptienne | » 75 |
| Alphonse Karr. | 1 » | Clarkioides | » 50 | Feu rougeâtre | » 75 |
| Amabilis striatiflora | » 75 | Cœlestis | 2 » | Fidalgi | 1 » |
| Amanda. | 1 » | Compacta elegans. | 1 » | Florida | 1 » |
| Amphitrium | » 75 | Conspicua | 1 » | Formosissima | » 50 |
| Aimé. | » 50 | Decamps | » 75 | Galathée. | » 75 |
| Beppo | » 75 | Delecta | » 75 | Gérard de S. Trond | 1 » |
| Baron Pronay | » 75 | Decandolli | » 50 | Germanica | » 75 |
| Belgica | » 50 | Delicata nova | 1 » | Goethe | 1 » |
| Bicolor | 1 » | Desdemona | 1 » | Hanno | » 75 |
| Broughtonii | » 50 | Donkelaarii. | » 50 | Helena | 2 » |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Helicon | 1 » | Miranda | 75 | Rodigasii | 1-50 |
| Herman Kegel | 1-50 | Nitens | 1 » | Schlacteri | 1 » |
| Humannii | 75 | Norfolkii | 50 | Sanguinea fol. aur. var. | 1 » |
| Insignis | 75 | Nymphe | 75 | Sertulosa | 1 » |
| Invincible | 75 | Oblita | 50 | Speciosissima | 50 |
| Infortunata | 50 | Odette | 1 » | Speculum | 1 » |
| Jenkinsoni | 50 | Olympia | 1 » | Standard of perfection | 1 » |
| Julia alpinule | 1 » | Ornata | 1 » | Striata grandiflora | 1 » |
| Juste Lipse | 1 » | Picta | 50 | Surpasse Lucie | 2 » |
| Latifolia foliis variegatis | 50 | Placida | 1 » | Triton | 75 |
| Linda | 1 » | Princesse Mariane | 50 | Tenera Emilia | 75 |
| Linnæana | 50 | Prince Maxm. von Neuwied | 75 | Talleyrand | 2 » |
| Lullingstonii | 50 | Purpurea | 75 | Tomporea | 2 » |
| Madame Renard | 1 » | Pyramidalis superba | 1 » | Triumphateur | 75 |
| Mariantha | 1 » | Reine du jour | 75 | Triomphe de St. Trond | 1 » |
| Mazeppa | 50 | Reine Louise | 1 » | Ulysse | 75 |
| Magniflora | 1 » | Regalis | 75 | Van Houttei | 50 |
| Merope | 2 » | Richilde | 75 | Versicolor | 75 |
| Mont St. Jean | 2 » | Rodokina | 75 | Vestale | 75 |
| Mundula | 50 | Rosette | 75 | Venus | 75 |
| Multiflora | 1 » | Robert de Flandre | 1 » | Virgilæ | 2 » |

GLADIOLUS.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------|--------|
| Blandus | 1-50 | Communis fl. albo | 20 | Psittacinus | 15 |
| — versicolor | 5 » | — les 12. | 2 » | — les 25. | 2-50 |
| Byzantinus | 20 | — fl. roseo | 20 | — sulphureus | 2 » |
| — les 25. | 2-50 | — les 12 | 2 » | Pyramidalis | 75 |
| — le 100 | 8 » | — les 25 | 5-50 | Ramosus | 75 |
| Cardinalis | 50 | Floribundus | 25 | Trimaculatus | 1 » |
| — les 12. | 5 » | — les 12. | 2-50 | Tristis | 1-50 |
| Colvilli | 50 | Hastatus | 1 » | Venustus | 2 » |
| — les 12. | 4 » | Hirsutus | 75 | | |

VARIÉTÉS DE RAMOSUS.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Amænus | 1-50 | Jucundus | 2 » | Rosa Mundii | 2 » |
| Amelia | 1-50 | John Russell | 2-50 | Regina | 1-50 |
| Amsterdam | 75 | Leibuitzi | 2 » | Rouge nouvelle | 5 » |
| Belvedere | 2-50 | La belle d'Utrecht | 2 » | Rubellus | 2 » |
| Christianus | 1 » | La renommée | 2 » | Rosa spectabilis | 2 » |
| Carneus | 1-50 | Lehmannii | 1-50 | — superba | 4 » |
| Dumont d'Urville | 1-50 | Louis-Philippe | 5 » | Speciosus | 1-50 |
| Eclatante frappante | 2 » | Monstrosus | 1-50 | Superba | 1-50 |
| Ernest Maltravers | 2 » | Orange superbe | 2 » | Van Dam Van Isselt | 1-50 |
| Feu brillant | 2 » | Prince Frédéric | 2 » | Van Hall | 1-50 |
| Formosissimus | 2 » | — des Pays-bas | 2 » | Van Siebold | 6 » |
| Gloriosus | 1 » | — Albert | 2 » | Wilhelmus | 1-50 |
| Hendricus | 2-50 | Princesse Sophie | 2 » | Wilhelmus II | 1-50 |
| Hermannii | 2-50 | Queen Victoria | 2 » | Zenobia | 5 » |
| Insignis | 6 » | — Bess | 4 » | | |

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|------------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Agricola. | 1-50 | Fischerianum | 2 » | Princesse Léopoldine. | » 50 |
| Comte d'Arscot | 1-50 | Gandavensis | » 57 | Parc d'Enghien | 2 » |
| Clusiana. | 1-50 | Gretry | 2 » | Salmianus | 2 » |
| Candolli. | 2 » | Herbertii | 1-50 | Schwarzenbergianus. | 2 » |
| Duchesse d'Arenberg. | 1-50 | Jussieui | 1-50 | Steinbergianus. | 2 » |
| Douglasianum | 2 » | Louisiana | 1-50 | Virgilianum | 1-50 |
| Duc d'Ursel. | 2 » | Martianus | 1-50 | | |

Gladiolus Gandavensis en mélange sans noms, le cent. fr. 40 »

Ixia, 12 variétés avec noms pour. » 5 »

Sparaxis, 15 variétés avec noms pour. » 8 »

— en mélange, les 25. » 2 »

— le cent » 6 »

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Adiantum pedatum | 1 » | Ceterah officinarum | » 50 | Scolopendr officinarum. | » 75 |
| Aspidium filix mas | » 50 | Cyrtopteris fragilis | » 75 | — — angustifolium | 1-50 |
| — spinulosum | » 50 | Lomaria antaretica | » 5 » | — — daedaleum | 5 » |
| Asplenium alternifolium. | 8 » | — spicant | » 50 | — — undulatum | 1 » |
| — filix femina. | » 25 | Onoclea sensibilis | 1 » | Struthiopteris germanica | 1 » |
| — fontanum | » 4 » | Osmunda regalis | » 25 | Trichomanes speciosa | 10 » |
| — septentrionale | » 5 » | Scopodidium vulgare | » 75 | | |
| — trichomanes | 1 » | Scolopendrium auriculat. | 1 » | | |

PIVOINES EN ARBRE.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|------------------------------|------------|
| Arborea suffructicosa | 1-50 | Papaveracea alba pleno | 4 » | Rosa gallica | » 4 » |
| — — fort | 2 à 4 » | — Leodiensis | » 5 » | Rubescens | » 6 » |
| Delachei. | » 6 » | — rubra pleno. | » 5 » | Triomphe de Malines. | » 15 » |
| Lilacina plenissima | » 5 » | Phœnicea pleno | » 10 » | Victoire Mathieu | » 6 à 15 » |
| Nivea fl. pleno. | » 50 | Purpureo violacea superba | 5 à 6 » | Lefebvriana | » 25 » |
| Papaveracea | 2 à 4 » | | | | |

FRAISIERS, les 25 Plantes.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--|--------|
| Bechide | 1-50 | A feuilles panachées de | » 75 | Mammoth (Myatt) | » 75 |
| Blanche de Bicton. | 1 » | blanc | » 75 | Prince Albert (Myatt) | 1 » |
| British Queen (Myatt) | 1-50 | Globe (Myatt) | » 75 | Princesse Alice Maud. | 1 » |
| Comte de Paris (Pelvilain) | 1-50 | Hooper's Seedling | » 75 | Princesse royale (Pelvilain) | 1-50 |
| Deptford Pine (Myatt) | 1 » | Jowa d'Amérique. | 1 » | Prolific (Myatt) | » 75 |
| Elisa (Myatt) | 1 » | Liegeoise (Haquin) | » 75 | | |

PLANTES AQUATIQUES,

Propres à orner les Bassins des Serres.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| Aponogetum distachyon. | 1 » | Crinum Americanum. | » 5 » | Nymphaea pygmaea | » 5 » |
| — junceum | » 6 » | Limnocharis Humboldtii | » 50 | Pistia stratiotes | » 5 » |
| Calla aethiopica | 1 » | Nelumbium caspicum | » 5 » | Pontederia crassipes | » 4 » |
| Colocasia esculenta | 1 » | — — flavesceus | » 5 » | Strelitzia reginae | » 5 à 10 » |
| Cyperus papyrus | » 5 » | — luteum | 1 » | Thalia dealbata | » 5 » |
| Crinum amabile | » 5 à 10 » | Nymphaea caerulea | 2 » | | |

| | |
|--|--------|
| 50 belles variétés à mon choix | fr. 50 |
| 50 idem nouvelles | » 50 |

Prix avantageux de quelques Collections, articles au cent, etc.

Je fournis à mon choix :

| | Fr. C. |
|--|------------|
| 20 variétés d'Achimenes | 8 » |
| 10 — d'Eschynanthus | 9 » |
| 10 — Begonia | 5 » |
| 15 — Gloxinia | 7 » |
| 100 Lilium longiflorum | 10 » |
| 100 — lancifolium rubrum, petit | 40 » |
| 100 — — — à fleurir | 100 » |
| 100 — — — album, petit | 40 » |
| 100 — — — à fleurir | 100 » |
| 20 variétés d'Orchidées à mon choix | 60 » |
| 20 — de Cactus | 20 » |
| 100 — différentes plantes de Serre Chaude | 50 » |
| 100 — différentes de Serre Froide | 50 » |
| 100 — différentes de Plantes Vivaces de pleine terre | 40 » |
| 25 — d'Azalea indica | 17 » |
| 100 Camellia simples de un an | 15 » |
| 100 Kalmia latifolia en boutons | 50 » |
| 100 idem plus fort | 100 » |
| 50 Azaleas de pleine terre en boutons, avec noms | 50 » |
| 100 idem en mélange en boutons | 50 » |
| 100 Rhododendrum ponticum en boutons | 40 » |
| 12 — hirsutum | 9 » |
| 12 — hybridum | 9 » |
| 50 — Catawbiense (vrai) sans boutons | 50 » |
| 50 Magnolia purpurea | 20 » |
| 100 Laurus cerasus, belles plantes | 50 » |
| 50 — Portugal, belles plantes | 20 » |
| 100 Rosiers Mousseux, pour forcer | 75 à 100 » |
| 100 — cent feuilles, pour forcer | 50 à 100 » |
| 50 Berberis, en mélange | 25 » |
| 25 Variétés de Pivoines herbacées | 25 » |
| 6 Ledum, en variétés | 4 » |

STRELITZIA NIVENII. . Fr. 100.

On peut se procurer dans l'Établissement, tous les Arbres Fruitiers et Forestiers, Arbres et Arbustes d'agrément, etc., à des prix très-modérés.

COLLECTIONS DE GRAINES.

| | Fr. C. | | Fr. C. | | Fr. C. |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Plantes Annuelles. | | 25 variétés pour | 2-50 | Plantes pour Bordures. | |
| 100 variétés pour | 9 » | Plantes de Serre. | | 50 sortes pour | 5 » |
| 50 — — | 4-50 | 100 variétés pour | 15 » | 15 — — | 1-50 |
| 25 — — | 2-25 | 75 — — | 10-75 | Plantes Grimpantes. | |
| Plantes Vivaces. | | 50 — — | 7 » | 20 variétés pour | 2 » |
| 100 variétés pour | 10 » | 25 — — | 3-25 | 10 — — | 1 » |
| 50 — — | 5 » | 12 — — | 1-25 | | |



TABLE

Des principales matières contenues dans ce Prix-Courant.

| | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Abutilon | 9 | Gesneria | 3 |
| Acacia | 9 | Gladiolus | 40 |
| Achimenes | 1 | — Gandavensis | 41 |
| Æschynanthus | 1 | Gloxinia | 5 |
| Alstroëmeria | 9 et 33 | Graines diverses | 41 |
| Amaryllis | 1, 9 et 33 | Hydrangea | 12 |
| Anemones | 9 et 33 | Iris | 35 |
| Andromeda | 29 | Ixia | 41 |
| Anthirrinum | 39 | Ixora | 4 |
| Aralia | 1, 9 et 29 | Kalmia | 50 |
| Araucaria | 27 | Kennedya | 12 |
| Arbres Fruitières et Forestiers | 41 | Ledum | 41 |
| Articles au cent, etc. | 42 | Lilium | 56 |
| Auricula | 33 | Lobellia | 56 |
| Azalea indica | 25 | Luculia | 4 |
| — de pleine terre | 29 | Magnolia | 4, 12 et 50 |
| Banksia | 9 | Manettia | 4 |
| Begonia | 2 | Martagons | 56 |
| Berberis | 10 et 29 | Musa | 4 |
| Bonapartia | 10 | Mussanda | 4 |
| Borreria | 10 | Napoleona | 4 |
| Cactus | 5 | Nerium | 15 |
| Calceolaria | 10 | OEillets | 56 |
| Camellia | 14 | Orangers | 10 |
| — sauvagesons | 25 | Orchidées | 6 |
| — au cent | 25 | Pæonias | 37 |
| Chirita | 2 | — arborea | 41 |
| Chorisema | 10 | Palmiers et Cycadées | 6 |
| Chrysanthemum | 39 | Pandanus | 6 |
| Cineraria | 25 | Passiflora | 4 et 15 |
| Clematis | 34 | Pavetta | 4 |
| Clerodendron | 2 et 34 | Pensées anglaises | 37 |
| Collections avantageuses | 42 | Pentstemon | 37 |
| Conifères | 27 | Petunia | 15 |
| Correa | 10 | Phlox | 15 et 39 |
| Cryptomeria | 27 et 29 | Pimelia | 13 |
| Cuphea | 11 | Pinus | 27 et 50 |
| Cycadées | 6 | Pitcairnia | 4 |
| Cyclamen | 11 | Plantes aquatiques | 41 |
| Cypripedium | 7 et 34 | Plantes de serre froide | 9 |
| Dahlia | 42 | — de serre chaude | 1 |
| Daphne | 11 | — de pleine terre | 29 |
| Dianthus | 34 | — vivaces de pleine terre | 33 |
| Dichorisandra | 2 | Potentilla | 37 |
| Dipladenia | 2 | Primula veris | 37 |
| Dracaena | 2 | Protea | 15 |
| Echites | 2 | Rhododendrum | 28 |
| Epacris | 11 | — jaunes | 28 |
| Epimedium | 35 | Ribes | 50 |
| Erica | 11 | Rosiers | 31 |
| Erythrina | 11 | Scilla | 58 |
| Fougères de serre chaude | 8 | Sparaxis | 41 |
| — de serre froide | 9 | Spirea | 50 |
| — de pleine terre | 41 | Statice | 13 et 58 |
| Fraisiers | 41 | Strelitzia | 5 et 42 |
| Franciscea | 3 | Strelitzia Nivenii | 42 |
| Fuschsia | 25 | Tropæolum | 14 |
| Funkia | 35 | Verbena | 27 |
| Gardenia | 3 | Veronica | 14 |
| Geranium | 26 | Yucca | 13 et 14 |

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

1
17
— 228
78